Инструкция по применению
Селмевит Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30



Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой розового цвета, с характерным запахом. На поперечном разрезе видны два слоя: ядро - неоднородное по окраске и оболочка розового цвета.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Состав на одну таблеткуВитамин А (ретинола ацетат) - 0,568 мг (1650 МЕ)(в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1650 МЕ, сахарозу - 0,1155 мг, крахмал модифицированный - 0,594 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0099 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00462 мг, желатин - 0,825 мг, воду очищенную до 3,3 мг) - (в пересчете на 100 % вещество)Витамин Е (а-токоферола ацетат) - 7,50 мг(в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола вещество) ацетат - 7,50 мг, мальтодекстрин - 3,675 мг, модифициро¬ванный пищевой крахмал - 3,675 мг, кремния диоксид -0,15 мг) - мг (в пересчете на 100 % вещество)Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) - 0,581 мгВитамин В2 (рибофлавин) - 1,00 мгВитамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - 2,50 мгВитамин С (аскорбиновая кислота) - 35,00 мгНикотинамид - 4,00 мгФолиевая кислота - 0,05 мгРутин (рутозид) - 12,50 мгКальция пантотенат - 2,50 мгВитамин В12 (цианокобаламин) - 0,003 мгТиоктовая кислота (липоевая кислота) - 1,00 мгМетионин - 100,00 мгФосфор (в виде кальция гидрофосфата дигидрата и в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 30,00 мгЖелезо (в виде железа сульфата гептагидрата) - 2,50 мгМарганец (в виде марганца сульфата пентагидрата) - 1,25 мгМедь (в виде меди сульфата пентагидрата) - 0,40 мгЦинк (в виде цинка сульфата гептагидрата) - 2,00 мгМагний (в виде магния гидрофосфата тригидрата и в виде магния карбоната) - 40,00 мгКальций (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 25,00 мгКобальт (в виде кобальта сульфата гептагидрата) - 0,05 мгСелен (в виде натрия селенита) - 0,025 мгВспомогательные вещества: крахмал картофельный - 59,38 мг, лимонной кислоты моно¬гидрат - 10,8 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) -1,85 мг, кальция стеарат - 5,40 мг, тальк - 2,00 мг, сахароза (сахар-песок) - 18,82 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 1,40 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг.Состав оболочки: сахароза (сахар-песок) - 140,75 мг, мука пшеничная - 49,33 мг, магния карбонат - 74,00 мг, метилцеллюлоза (метилцеллюлоза водорастворимая) - 1,31 мг, желатин - 0,160 мг, титана диоксид - 3,71 мг, краситель азорубин (Е 122) - 0,03 мг, воск пчелиный - 0,36 мг, тальк - 0,35 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика и лечение витаминно-минеральной недостаточности, в том числе возникающей: при повышенных физических и умственных нагрузках, стрессовых ситуациях, при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды, при проживании в экологически неблагоприятных и селен-дефицитных районах.

Способ применения и дозы

Состав на одну таблеткуВитамин А (ретинола ацетат) - 0,568 мг (1650 МЕ)(в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1650 МЕ, сахарозу - 0,1155 мг, крахмал модифицированный - 0,594 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0099 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00462 мг, желатин - 0,825 мг, воду очищенную до 3,3 мг) - (в пересчете на 100 % вещество)Витамин Е (а-токоферола ацетат) - 7,50 мг(в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола вещество) ацетат - 7,50 мг, мальтодекстрин - 3,675 мг, модифициро¬ванный пищевой крахмал - 3,675 мг, кремния диоксид -0,15 мг) - мг (в пересчете на 100 % вещество)Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) - 0,581 мгВитамин В2 (рибофлавин) - 1,00 мгВитамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - 2,50 мгВитамин С (аскорбиновая кислота) - 35,00 мгНикотинамид - 4,00 мгФолиевая кислота - 0,05 мгРутин (рутозид) - 12,50 мгКальция пантотенат - 2,50 мгВитамин В12 (цианокобаламин) - 0,003 мгТиоктовая кислота (липоевая кислота) - 1,00 мгМетионин - 100,00 мгФосфор (в виде кальция гидрофосфата дигидрата и в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 30,00 мгЖелезо (в виде железа сульфата гептагидрата) - 2,50 мгМарганец (в виде марганца сульфата пентагидрата) - 1,25 мгМедь (в виде меди сульфата пентагидрата) - 0,40 мгЦинк (в виде цинка сульфата гептагидрата) - 2,00 мгМагний (в виде магния гидрофосфата тригидрата и в виде магния карбоната) - 40,00 мгКальций (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 25,00 мгКобальт (в виде кобальта сульфата гептагидрата) - 0,05 мгСелен (в виде натрия селенита) - 0,025 мгВспомогательные вещества: крахмал картофельный - 59,38 мг, лимонной кислоты моно¬гидрат - 10,8 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) -1,85 мг, кальция стеарат - 5,40 мг, тальк - 2,00 мг, сахароза (сахар-песок) - 18,82 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 1,40 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг.Состав оболочки: сахароза (сахар-песок) - 140,75 мг, мука пшеничная - 49,33 мг, магния карбонат - 74,00 мг, метилцеллюлоза (метилцеллюлоза водорастворимая) - 1,31 мг, желатин - 0,160 мг, титана диоксид - 3,71 мг, краситель азорубин (Е 122) - 0,03 мг, воск пчелиный - 0,36 мг, тальк - 0,35 мг.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Беременность, период грудного вскармливания. Детский возраст до 12 лет. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка

Аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови салицилатов, этинилэстрадиола, бензилпенициллина и тетрациклинов, снижает концентрацию пероральных контрацептивов, уменьшает антикоагулянтный эффект производных кумарина. Препараты кальция, колестирамин, неомицин уменьшают всасывание ретинола ацетата. а-токоферола ацетат усиливает эффект сердечных гликозидов, стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Особые указания

Не рекомендуется принимать одновременно другие препараты, содержащие в своем составе поливитамины с микроэлементами и превышать рекомендуемую суточную дозу.Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмамиПрепарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автотранспорта и выполнению других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови салицилатов, этинилэстрадиола, бензилпенициллина и тетрациклинов, снижает концентрацию пероральных контрацептивов, уменьшает антикоагулянтный эффект производных кумарина. Препараты кальция, колестирамин, неомицин уменьшают всасывание ретинола ацетата. а-токоферола ацетат усиливает эффект сердечных гликозидов, стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов.