Инструкция по применению
Селмевит Таблетки покрытые оболочкой 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 60



Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: действующие вещества: Ретинола ацетат (вит. А) 0,568 мг (1650 МЕ), а-Токоферола ацетат (вит. Е) 7,5 мг, Тиамина гидрохлорид (вит. В1) 0,581 мг, Рибофлавин (вит. В2) 1 мг, Пиридоксина гидрохлорид (вит. В6) 2,5 мг, Аскорбиновая кислота (вит. С) 35 мг, Никотинамид 4 мг, Фолиевая кислота 50 мкг, Рутин 12,5 мг, Кальция пантотенат 2,5 мг,   Цианокобаламин (вит. В12) 3 мкг, Липоевая кислота 1 мг, Метионин 100 мг, Фосфор (в форме кальция и магния фосфата) 30 мг, Железо (в форме сульфата) 2,5 мг, Марганец (в форме сульфата) 1,25 мг, Медь (в форме сульфата) 400 мкг, Цинк (в форме сульфата) 2 мг, Магний (в форме фосфата и основного карбоната) 40 мг, Кальций (в форме сульфата) 25 мг, Кобальт (в форме сульфата) 50 мкг, Селен (в форме натрия селенита) 25 мкг, Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 59,38 мг, лимонной кислоты моногидрат - 10,8 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 1,85 мг, кальция стеарат - 5,40 мг, тальк - 2,00 мг, сахароза (сахар-песок) - 18,82 мг, желатин, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 1,40 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг. Состав оболочки: сахароза (сахар-песок) - 140,75 мг, мука пшеничная - 49,33 мг, магния карбонат - 74,00 мг, метилцеллюлоза (метилцеллюлоза водорастворимая) - 1,31 мг, желатин - 0,160 мг, титана диоксид - 3,71 мг, краситель азорубин (Е 122) - 0,03 мг, воск пчелиный - 0,36 мг, тальк - 0,35 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика и лечение витаминно-минеральной недостаточности, в том числе возникающей: - при повышенных физических и умственных нагрузках, стрессовых ситуациях, - при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды, - после перенесенных травм, операций, обострений хронических заболеваний и др.

Способ применения и дозы

Перед началом лечения следует проконсультироваться с врачом. Внутрь после еды. Взрослым и детям старше 12 лет с целью профилактики витаминно-минеральной недостаточности по 1 таблетке в сутки. Курс приёма 4 недели. Возможны повторные курсы по рекомендации врача. Для восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ, в т.ч. при напряженной умственной или физической работе, стрессах - по 1 таблетке 2 раза в сутки. Курс приёма 4 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Беременность, период грудного вскармливания. Детский возраст до 12 лет.   Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови салицилатов, этинилэстрадиола, бензилпенициллина и тетрациклинов; снижает концентрацию пероральных контрацептивов; уменьшает антикоагулянтный эффект производных кумарина. Препараты кальция, колестирамин, неомицин уменьшают всасывание ретинола ацетата. а-токоферола ацетат усиливает эффект сердечных гликозидов, стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Особые указания

Не рекомендуется принимать одновременно другие препараты, содержащие поливитамины и микроэлементы, и превышать рекомендуемую суточную дозу.   Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автотранспорта и выполнению других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.