Инструкция по применению
Семакс Капли назальные 1 % 3 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Пептоген
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил- пролил-глицил- пролин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Метионил-глутамил- гистидил-фенилаланил- пролил-глицил- пролин

Состав

1 мл содержит:метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин 10 мг.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Всасывается со слизистой оболочки носовой полости, при этом усваивается до 60-70% в пересчете на активное вещество. Семакс быстро распределяется по всем органам и тканям, проникает через гематоэнцефалический барьер. При попадании в кровь Семакс подвергается достаточно быстрой биотрансформации и выведению из организма с мочей.

Показания

Острый период ишемического инсульта. Транзиторные ишемические атаки. Восстановлении после инсульта.Острый период ЧМТ.

Способ применения и дозы

Семакс применяется интраназально. В качестве скорой медицинской помощи в первые минуты и часы возникновения инсульта - на догоспитальном этапе - «Семакс 1 %» вводится по 3 капли в каждый носовой ход каждые 20 минут до поступления в стационар. На этапе лечения в стационаре «Семакс 1%» применяется: Инсульт средней тяжести - по 3 капли в каждый носовой ход 4 раза в день в течение 10 дней. Тяжелый инсульт - по 3 капли в каждый носовой ход 6 раз в день в течение 10 дней. Транзиторные ишемические атаки (ТИА) лечение на этапе стационара - по 3 капли в каждый носовой ход 3- 6 раз в день в течение 10 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Острые психотические состояния, расстройства, сопровождаемые тревогой.Беременность, грудное вскармливание.Заболевания эндокринной системы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано. Клинических исследований не проводилось.

Побочные действия

При длительном применении возможно - слабое раздражение слизистой оболочки носа.

Передозировка

Явлений передозировки препаратом до настоящего времени не удавалось выявить даже при значительном увеличении разовой дозы.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармацевтическое. Исходя из химической структуры препарата наличие химически несовместимых комбинаций не предполагается: препарат быстро разрушается и в желудочно-кишечный тракт не поступает.Фармакокинетическое. Учитывая химическую структуру препарата (гептапептид - синтетический аналог адренокортикотропного гормона, полностью лишенный гормональной активности), быстроту всасывания и скорость поступления в кровь, а также интраиазальный способ введения, влияние иных препаратов на фармакокинетические параметры Семакса не предполагается. Учитывая способ введения Семакса (интраназальный) нежелательно введение средств, обладающих местным сосудосуживающим действием при их интраназальном введении.

Особые указания

Противопоказан детям до 7 лет, а в офтальмологической и нейрохирургической практике применение у детей до 18 лет противопоказано.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении