Инструкция по применению
Семакс Капли назальные 0,1 % 3 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Пептоген
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил- пролил-глицил- пролин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.1%
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Метионил-глутамил- гистидил-фенилаланил- пролил-глицил- пролин

Состав

1 мл содержит:метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин 1 мг.
Вспомогательные вещества: вода очищенная, метилпарагидроксибензоат.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Всасывается со слизистой оболочки носовой полости, при этом усваивается до 60-70% в пересчете на активное вещество.Семакс капли назальные 0.1% быстро распределяется по всем органам и тканям, проникает через гематоэнцефалический барьер.При попадании в кровь Семакс капли назальные 0.1% подвергается быстрой биотрансформации и выведению из организма с мочей.

Показания

Интеллектуально-мнестические (память, внимание) расстройства, состояниях после черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций. профилактика и лечение постнаркозных и астеноневротических расстройств различного генеза. для повышения адаптации в экстремальных ситуациях. профилактикапсихического утомления. Офтальмология: атрофия зрительного нерва, невриты воспалительной, токсико-аллергической и сосудистой этиологии, глаукомная оптическая нейропатия (глаукома), диабетическая ретинопатия.В педиатрии используется для лечения минимальных мозговых дисфункций.

Способ применения и дозы

Семакс применяется интраназально. Нарушение памяти - по 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в день в течение 10 дней, рекомендуется 2 курса в год. Хроническая ишемия мозга, астено-невротические расстройства - по 3 капли в каждый носовой ход в течение 16 дней, рекомендуется 2-4 курса в год. Профилактика инсульта и ТИА - по 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в день в течение 10 дней, рекомендуется 2 курса в год. Восстановительный период после инсульта и ТИА - по 4 капли в каждый носовой ход 6 раз в день в течение 16 дней. Предотвращение (профилактика) повторных инсультов и ТИА - по 3 капли в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 16 дней, рекомендуется 2-3 курса в год. Черепно-мозговые травмы и нейрохирургические операции - по 3 капли в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 16 дней, рекомендован повторный курс через 6 месяцев. Лечение постнаркозных расстройств памяти и внимания - по 3 капли в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 6 дней. Минимальные мозговые дисфункции у детей, в том числе синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) - по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 20 дней, рекомендуется 2-4 курса в год. Глаукома, атрофия зрительного нерва - по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 20 дней, рекомендуется 2-4 курса в год. Повышение работоспособности, улучшение памяти, снижение стрессовой нагрузки - по 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в день в течение 10 дней, рекомендуется 1-2 курса в год.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Острые психотические состояния, расстройства, сопровождаемые тревогой.Беременность, грудное вскармливание.Заболевания эндокринной системы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период лактации противопоказано. Клинических исследований не проводилось.

Побочные действия

При длительном применении возможно - слабое раздражение слизистой оболочки носа.

Передозировка

Явлений передозировки препаратом до настоящего времени не удавалось выявить даже при значительном увеличении разовой дозы.

Взаимодействие с другими препаратами

Исходя из химической структуры препарата наличие химически несовместимых комбинаций не предполагается: препарат быстро разрушается и в ЖКТ не поступает. Фармакокинетическое Учитывая химическую структуру препарата (гептапептид - синтетический аналог адренокортикотропного гормона, полностью лишенный гормональной активности), быстроту всасывания и скорость поступления в кровь, а также интраиазальный способ введения, влияние иных препаратов на фармакокинетические параметры Семакса капли назальные 0.1% не предполагается. Учитывая способ введения Семакса капли назальные 0.1% (интраназальный) нежелательно введение средств, обладающих местным сосудосуживающим действием при их интраназальном введении.

Особые указания

Противопоказан детям до 7 лет, а в офтальмологической и нейрохирургической практике применение у детей до 18 лет противопоказано.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении