Инструкция по применению
Сенаде Таблетки 500 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Др.Реддис
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сеннозиды А и В
Количество в упаковке: 500
Дозировка действующего вещества: 13.5 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Сеннозиды А и В

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: сены листьев экстракт 93,33 мг (с содержанием суммы кальциевых солей сеннозидов А и В в пересчете на сеннозид В - 13,5 мг); ; Вспомогательные вещества: лактоза - 23,07 мг, крахмал - 43,56 мг, метилпарагидроксибензоат - 0,04 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 15,0 мг, тальк - 11,13 мг, магния стеарат - 0,93 мг, натрия лаурилсульфат - 0,93 мг, кармеллоза натрия - 2,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Запоры, вызванные гипотонией и вялой перистальтикой толстого кишечника. Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах.

Способ применения и дозы

Сенаде принимают внутрь обычно 1 раз в сутки вечером перед сном, запивая водой или каким-либо напитком.; Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 таблетке на прием. При отсутствии эффекта дозу можно увеличить до 2-3 таблеток.; Дети 6-12 лет: по 1/2 таблетки и при необходимости увеличивают дозу до 1-2 таблеток.; В процессе подбора одну и ту же дозу следует принимать в течение нескольких дней и постепенно увеличивать ее на 1/2 таблетки. Если после достижения максимальной дозы в течение 3 дней дефекация не происходит, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Сенаде,; спастический запор,; кишечная непроходимость,; боли в животе неясного генеза,; ущемленная грыжа,; острые воспалительные заболевания брюшной полости,; перитонит,; желудочно-кишечные и маточные кровотечения,; цистит,; нарушения водно-электролитного обмена.;

Применение при беременности и кормлении грудью

Не следует принимать при беременности (недостаточно изучены эффективность и безопасность).; На время лечения кормление грудью рекомендуется прекратить. Действующие вещества могут проникать в грудное молоко и вызывать частый жидкий стул у младенца.

Побочные действия

Слабительное действие препарата может сопровождаться коликообразными болями в животе, метеоризмом. При длительном применении, особенно в высоких дозах, возможны нарушения водно-электролитного обмена, альбуминурия, гематурия, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, тошнота, рвота, диарея, обесцвечивание мочи, кожная сыпь, судороги, сосудистый коллапс, утомляемость, спутанность сознания.

Передозировка

Симптомы: главный неблагоприятный эффект при передозировке — диарея, ведущая к обезвоживанию.; Лечение: консервативные меры — увеличение потребления жидкости. Этого обычно достаточно, чтобы скомпенсировать потерю жидкости и электролитов. В некоторых случаях приходится восполнять потерю жидкости и электролитов с помощью в/в инфузий плазмозаменителей.

Взаимодействие с другими препаратами

При длительном применении Сенаде в высоких дозах возможно усиление действия сердечных гликозидов и влияние на действие антиаритмических препаратов в связи с возможностью развития гипокалиемии.; При одновременном применении с тиазидными диуретиками, глюкокортикоидами, препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии.

Особые указания

Не рекомендуется применять препарат более 2 недель.; После приема препарата моча может приобретать желто-коричневый или красно-сиреневый цвет.

Условия хранения

В сухом месте