**Инструкция по применению**
**Сенадексин-Вифитех Таблетки 20 шт**

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сеннозиды А и В
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 70 мг




## Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от серовато-коричневого до коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями со слабым характерным запахом.

## Действующее вещество

Сеннозиды А и В

## Состав

На одну таблетку: Активный компонент Сенадексин -0,07 г [Сумма кальциевых солей сеннозидов А и В из кассии (сенны) остролистной листьев в пересчете на сухое вещество 20,0 %] Вспомогательные вещества Крахмал кукурузный - 0,1370 г Лактозы моногидрат - 0,0340 гТальк - 0,0049 г Кальция стеарат - 0,0020 г Магния стеарат - 0,0015 г Ванилин - 0,0003 г Метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,0003 г

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

Метаболиты антрагликозидов сенны практически не всасываются в основном выводятся с калом а также с мочой. Выводятся также с потом проникают в грудное молоко.

**Показания**

Хронический запор гипо- и атония кишечника регулирование стула при геморрое проктите и анальных трещинах очищение кишечника перед диагностическими и лечебными процедурами.

**Способ применения и дозы**

Принимают внутрь один раз в сутки вечером перед сном запивая водой. Взрослым и детям старше 12 лет - по 1-2 таблетки, при отсутствии эффекта дозу увеличивают до 2-3 таблеток на прием. Максимальная суточная доза - 3 таблетки. Следует применять наименьшую дозу необходимую для получения мягкого кала. В процессе подбора одну и ту же дозу следует принимать в течение нескольких дней и при отсутствии эффекта постепенно увеличивать дозу на 1/2 таблетки. Если при применении максимальной дозы в течение трех дней дефекация не происходит необходимо обратиться к врачу. Не следует применять препарат более двух недель. При необходимости курсового применения препарата по рекомендации врача после двух недель применения следует сделать перерыв на две недели.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата маточные кровотечения кишечная непроходимость спастический запор острые воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона язвенный колит аппендицит) перитонит пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки желудочно-кишечные кровотечения ущемленная грыжа цистит боль в области живота неустановленного генеза тяжелые нарушения водно-электролитного баланса беременность период грудного вскармливания дефицит лактазы непереносимость лактозы глюкозо-галактозная мальабсорбция детский возраст до 12 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата у беременных противопоказано в связи с более высокой вероятностью развития побочных эффектов (абдоминальные боли диарея). На время лечения препаратом кормление грудью рекомендуется прекратить так как компоненты препарата могут проникать в грудное молоко и вызывать частый стул у младенца.

**Побочные действия**

Со стороны желудочно-кишечного тракта: спастические боли в животе тошнота рвота диарея метеоризм атония толстого кишечника пигментация толстого кишечника (отложение пигмента меланина в слизистой оболочке толстой кишки). Аллергические реакции: кожный зуд эритема кожная сыпь. Со стороны мочеполовой системы: желтовато-коричневое или красноватое окрашивание мочи (за счет метаболитов выводящихся почками, это не является патологическим признаком и проходит после отмены препарата) протеинурия гематурия (при длительном применении особенно в высоких дозах). Нарушения метаболизма: гиповолемия гипокалиемия (при длительном приеме особенно в высоких дозах на фоне приема диуретиков кортикостероидов и сердечных гликозидов) вторичный гиперальдостеронизм. Прочие: утомляемость спутанность сознания мышечные судороги (при длительном применении). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

Симптомы: диарея рвота боли в области живота нарушение водно-электролитного баланса. Лечение: отмена препарата симптоматическая терапия восполнение жидкости и электролитов (особенно калия) для восстановления водно-электролитного равновесия.

**Взаимодействие с другими препаратами**

При длительном применении или применении в высоких дозах препарат усиливает эффект сердечных гликозидов и антиаритмических средств вследствие снижения содержания калия в организме нарушает абсорбцию антибиотиков тетрациклинового ряда. При одновременном применении с тиазидными диуретиками гормонами коры надпочечников и препаратами солодки повышается риск развития гипокалиемии. Снижает эффективность препаратов которые медленно всасываются в желудочно-кишечном тракте.

**Особые указания**

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. Препарат рекомендуется применять только в том случае если нормализации стула не удается добиться изменением диеты или применением препаратов увеличивающих объем кишечного содержимого. При длительном применении препарата может развиться привыкание в связи с чем его прием целесообразно чередовать с другими слабительными средствами. Больным сахарным диабетом необходимо учитывать что в одной таблетке содержится около 017 г углеводов (0014 ХЕ). Во время лечения кислая моча может приобретать желтовато-коричневый цвет щелочная - красноватый цвет. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.