Инструкция по применению
Сенадексин Таблетки 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Украина
Производитель: Здоровье
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сеннозиды А и В
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 70 мг
Срок годности: 36.0



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от серо-коричневого до коричневого цвета с вкраплениями более темного и более светлого цвета, с запахом ванилина.

Действующее вещество

Сеннозиды А и В

Состав

В 1 таблетке: активный ингредиент: кальция сеннозиды 20 % - 70 мг. вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, крахмал кукурузный, ванилин, магния стеарат, метилпарагидроксибензоат (нипагин), кислота стеариновая, тальк, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармелоза.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Метаболиты антрагликозидов сенны практически не всасываются, в основном выводятся с калом, а также с мочой. Выделяются также с потом, проникают в грудное молоко.

Показания

Хронический запор, гипо- и атония кишечника, облегчение опорожнения кишечника при геморрое, проктите и трещинах заднего прохода, очищение кишечника перед диагностическими и лечебными процедурами.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, один раз в сутки, запивая жидкостью. Взрослым и детям старше 12 лет назначают перед сном, детям младше 12 лет - утром натощак. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1-2 таблетки, при отсутствии эффекта дозу увеличивают до 2-3 таблеток на прием. Максимальная суточная доза - 3 таблетки. Детям в возрасте от 6 до 12 лет назначают по 1 таблетке. Максимальная суточная доза - 2 таблетки. Детям в возрасте от 3 до 6 лет назначают по ½-1 таблетке. Максимальная суточная доза - 1½ таблетки. Детям в возрасте от 1 года до 3 лет назначают по ½ таблетки. Максимальная суточная доза - 1 таблетка. Следует применять наименьшую дозу, необходимую для получения мягкого кала. При подборе дозы следует одну и ту же дозу применять в течение нескольких дней, при отсутствии эффекта - постепенно увеличивать дозу на ½ таблетки. Если при применении максимальной дозы в течение трех дней дефекация не происходит, необходимо обратиться к врачу. При курсовом применении после двух недель применения препарата следует сделать перерыв в две недели. Не следует применять длительное время или в дозах, превышающих рекомендованные.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к препаратам сенны и другим компонентам препарата, Метроррагии, паралитическая кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит), перитонит, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, ущемленная грыжа, цистит, боль в области живота неустановленного генеза, Тяжелые нарушения водно-электролитного баланса, Детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата у беременных сопряжено с более высокой вероятностью развития побочных эффектов (абдоминальные боли, диарея). На время лечения препаратом кормление грудью рекомендуется прекратить, т. к. компоненты препарата могут проникать в грудное молоко и вызывать частый жидкий стул у младенца.

Побочные действия

Препарат обычно хорошо переносится, редко возможны анорексия, боль в области живота, диарея, изменение окраски мочи (красная или коричневая), аллергические реакции. При длительном применении возможны потеря электролитов, в основном калия, метеоризм, альбуминурия, гематурия, псевдомеланоз кишечника, атония толстого кишечника, нарушения пищеварения.

Передозировка

При передозировке может развиться диарея, приводящая к нарушениям водно-электролитного баланса. В этом случае следует отменить прием препарата. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При длительном применении или применении в высоких дозах препарат усиливает эффект сердечных гликозидов и антарктических средств вследствие снижения содержания калия в организме, нарушает абсорбцию тетрациклинов. При одновременном применении с тиазидными диуретиками, гормонами коры надпочечников, препаратами из корня солодки повышается риск развития гипокалиемии. Снижает эффективность препаратов, которые медленно всасываются в желудочно-кишечном тракте.

Особые указания

Во время лечения кислая моча может приобретать желтовато-коричневый цвет, щелочная - красноватый цвет. Препарат рекомендуется применять только в том случае, если нормализации стула не удается добиться изменением диеты или применением препаратов, увеличивающих объем кишечного содержимого.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат обычно не влияет на управление транспортными средствами и выполнение работ, требующих повышенного внимания, быстроты психических и двигательных реакций. Однако необходимо проверить индивидуальную реакцию на препарат.

Условия хранения

В сухом месте