Инструкция по применению
Сенны листья 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Листья измельченные
Страна: Россия
Производитель: Иван-Чай
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сенны остролистной листья
Количество в упаковке: 1

Описание

Смесь кусочков листьев, черешков, тонких стеблей, лепестков, чашелистиков и плодов, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Цвет серовато-зеленый или светло-зеленый с вкраплениями желтоватого, беловатого, коричневого цвета. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый, с ощущением слизистости. Характеристика препарата:Сенны листья содержат антрагликозиды (глюкоалоэ-эмодин, глюкореин, сеннозиды А и В), флавоноиды, смолистые вещества, слизи, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

Действующее вещество

Сенны остролистной листья

Форма выпуска

Листья измельченные

Показания

Хронический запор (гипо-, атония толстой кишки), регулирование стула при геморрое и проктите (вне обострения), анальных трещинах.

Способ применения и дозы

3,0 г листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, закрывают крышкой и настаивают до полного охлаждения, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.Принимают внутрь по 1/2 стакана вечером после еды.Курс лечения 2-3 недели.Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, прободная язва, кишечная непроходимость, боль в животе неясного генеза, нарушения водно-электролитного обмена, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, проктит и геморрой в стадии обострения, ущемленная грыжа, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, маточное кровотечение, цистит, спастический колит, спастический запор, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, боль в животе, метеоризм, диарея. При длительном применении - колит.

Передозировка

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного обмена.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препараты сенны снижают абсорбцию тетрациклина.

Особые указания

При длительном применении препаратов сенны может развиться привыкание, поэтому их применение целесообразно чередовать с другими слабительными средствами.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не изучено.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.Хранить в недоступном для детей месте.