Инструкция по применению
Сеннаплант таблетки 13,5 мг 240 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сеннозиды А и В
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 13.5 мг



Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрические, с риской и фаской, от коричневого до серо-коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями, с запахом мяты, усиливающимся при растирании.

Действующее вещество

Сеннозиды А и В

Состав

Состав на одну таблетку: Активный компонент: сенны листьев экстракт сухой (15:1, экстрагент спирт этиловый 70 %, с содержанием суммы гидроксиантраценовых гликозидов в пересчете на сеннозид В 14,5 %) - 93,33 мг, Вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая – 58,64 мг, крахмал прежелатинизированный – 58,64 мг, кроскармеллоза натрия - 11,50 мг, тальк – 4,60 мг, кремния диоксид коллоидный - 2,30 мг, магния стеарат – 0,70 мг, мяты перечной листьев масло – 0,29 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Метаболиты антрагликозидов сенны практически не всасываются в основном выводятся с калом а также с мочой. Выделяются также с потом проникают в грудное молоко.

Показания

- Хронический запор гипо- и атония кишечника, - регулирование стула при геморрое проктите анальных трещинах, - очищение кишечника перед диагностическими и лечебными процедурами.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь 1 раз в сутки вечером перед сном запивая водой. Взрослым и детям старше 12 лет: по 1 таблетке на прием. При отсутствии эффекта дозу можно увеличить до 2-3 таблеток. Следует применять наименьшую дозу необходимую для получения мягкого кала. При подборе дозы следует одну и ту же дозу применять в течение нескольких дней при отсутствии эффекта - постепенно увеличивать дозу на ½ таблетки. Если при применении максимальной дозы в течение трех дней дефекация не происходит необходимо обратиться к врачу. Максимальная суточная доза препарата - 3 таблетки. Не следует применять препарат более 2 недель. При необходимости курсового применения препарата по рекомендации врача после двух недель применения следует сделать перерыв на две недели.

Противопоказания

- Повышенная индивидуальная чувствительность к препаратам сенны или другим компонентам препарата, - маточные кровотечения кишечная непроходимость спастический запор острые воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона язвенный колит аппендицит) перитонит пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки желудочно-кишечные кровотечения ущемленная грыжа цистит боль в области живота неустановленного генеза, - тяжелые нарушения водно-электролитного баланса, - беременность период грудного вскармливания, - детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не следует принимать при беременности (недостаточно изучены эффективность и безопасность). На время лечения препаратом кормление грудью рекомендуется прекратить т.к. компоненты препарата могут проникать в грудное молоко и вызывать частый жидкий стул у младенца.

Побочные действия

Классификация частоты развития побочных эффектов (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)): Очень частые ≥1/10 Частые 1/10 - 1/100 Нечастые 1/100- 1 /1000 Редкие 1/1000- 1/10000 Очень редкие <1/10000 Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко - спастические боли в животе тошнота рвота и диарея метеоризм атония толстого кишечника (при длительном применении) пигментация толстого кишечника (отложение пигмента меланина в слизистой оболочке толстой кишки). Аллергические реакции: редко - кожный зуд эритема кожная сыпь. Со стороны мочеполовой системы: желтовато-коричневое или красноватое окрашивание мочи (за счет метаболитов выводящихся почками, это не является патологическим признаком и проходит после отмены препарата) протеинурия гематурия (при длительном применении особенно в высоких дозах). Нарушения метаболизма: гиповолемия гипокалиемия (при длительном применении особенно в высоких дозах на фоне приема диуретиков кортикостероидов и сердечных гликозидов) вторичный гиперальдостеронизм. Прочие: утомляемость спутанность сознания мышечные судороги (при длительном применении).

Передозировка

Симптомы: боль в животе диарея рвота с последующей потерей воды и электролитов. Лечение: симптоматическое восполнение жидкости и электролитов (особенно калия) для восстановления электролитного равновесия что особенно важно для детей и пожилых людей.

Взаимодействие с другими препаратами

При длительном применении или применении в высоких дозах препарат усиливает действие сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов вследствие снижения содержания калия в организме нарушает абсорбцию тетрациклинов. При одновременном применении с тиазидными диуретиками глюкокортикоидами препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии. Снижает эффективность препаратов которые медленно всасываются в желудочно-кишечном тракте.

Особые указания

Эффективная доза препарата определяется индивидуально. Лечение начинают с минимально возможной дозы (1 таблетка). Развитие диареи является признаком передозировки препарата и в этом случае его доза должна быть уменьшена. При частой или ежедневной потребности в слабительных средствах следует обратиться к врачу для установления причины запоров. При развитии запоров рекомендуется употребление в пищу продуктов богатых растительными волокнами потребление большого количества жидкости и физические упражнения. Длительное применение препарата может привести к формированию привыкания с потребностью в постоянном увеличении его доз и нарушением водно-электролитного баланса (в частности гипокалиемия) а также к атонии кишечника. В связи с этим рекомендуется чередовать прием препарата с другими слабительными средствами. Пигментация толстого кишечника может быть следствием хронического приема слабительных содержащих гидроксиантраценовые гликозиды. Это состояние обратимо и проходит после отмены таких препаратов. После приема препарата моча может приобретать желто-коричневый или красноватый цвет. Это не является патологическим признаком и проходит после отмены препарата самостоятельно. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами работа с движущимися механизмами).

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.