Инструкция по применению
Септилин Плюс Таблетки 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Хималайя
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Компоненты растительного происхождения
Количество в упаковке: 1

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки зеленовато-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета.

Действующее вещество

Компоненты растительного происхождения

Состав

Каждая таблетка содержит: Активные компоненты: Порошки: Коммифора мукул (смесь масла, камеди и смолы) 324,0 мг Шанкх бхасма (зола) 64,0 мг Экстракт сухой из сбора растительного сырья*: 368,0 мг Махараснади кват** (многокомпонентная растительная смесь) 35%, тиноспоры сердцелистной стеблей 27%, марены сердцелистной корней 17%, эмблики лекарственной плодов 9%, моринги крылатосеменной листьев 9%, солодки голой корней 3%. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 57,0 мг, кросповидон 43,0 мг, кармеллоза натрия 11,0 мг, кремния диоксид коллоидный 5,0 мг, магния стеарат 3,0 мг. Примечания: *В качестве экстрагента для приготовления экстракта из сбора растительного сырья используется вода. Соотношение (сбор: экстракт сухой - 5:1). **В состав многокомпонентной растительной смеси "Махараснади кват" входят: терминалии чебули околоплодники - Terminalia chebula Retz. (Combretaceae), терминалии беллерики околоплодники - Terminalia bellerica L. (Combretaceae), эмблики лекарственной плоды - Emblica officinalis Gaertn. (Euphorbiaceae), фагонии критской целое растение - Fagonia cretica L. (Zygophyllaceae), сиды сердцелистной целое растение - Sida cordifolia L. (Malvaceae), клещевины обыкновенной целое растение - Ricinus communis L. (Euphorbiaceae), кедра гималайского древесина - Cedrus deodara (Roxb.ex Lamb.) G. Don (Pinaceae), гедихия колоскового корневища - Hedychium spicatum Ham.ex.Sm. (Zingiberaceae), адатоды настоящей корни - Adhatoda vasica Nees. (Acanthaceae), имбиря лекарственного корневища - Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae), перца явского длинного стебли - Piper chaba L. (Piperaceae), сыти круглой корневища - Cyperus rotundus L. (Cyperaceae), берхавии раскидистой корни - Boerhaavia diffusa L. (Nyctaginaceae), тиноспоры сердцелистной стебли - Tinospora cordifolia Miers. (Menispermaceae), ипомеи пальчатой корни - Ipomoea digitata L. (Convolvulaceae), укропа индийского плоды - Anethum sowa Roxb. ex Flem. (Apiaceae), якорцев стелющихся плоды - Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae), витании снотворной корни - Withania somnifera L. Dunal. (Solanaceae), кассии дудчатой мякоть плода - Cassia fistula L. (Fabaceae), спаржи кистевидной корневые клубни - Asparagus racemosus Willd. (Liliaceae), перца длинного плоды - Piper longum L. (Piperaceae), барлерии пильчатой целое растение - Barleria prionitis L. (Acanthaceae), кориандра посевного целое растение - Coriandrum sativum L. (Apiaceae), паслена желтоплодного целое растение - Solanum xanthocarpum Schrad.et Wendl. (Solanaceae), паслена индийского целое растение - Solanum indicum L. (Solanaceae). Названия производящих растений (в составе активных компонентов) на латинском языке: Тиноспора сердцелистная - Tinospora cordifolia Miers. (Menispermaceae), марена сердцелистная - Rubia cordifolia L. (Menyanthaceae), эмблика лекарственная - Emblica officinalis Gaertn. (Euphorbiaceae), моринга крылатосеменная - Moringa pterygosperma Gaertn. (Moringaceae), солодка голая - Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике многокомпонентного растительного препарата СЕПТИЛИН ПЛЮС в лекарственной форме таблетки отсутствуют. Активность препарата обусловлена взаимно усиливающим сочетанным действием его компонентов, что характерно для растительных лекарственных средств. Поскольку активность препарата нельзя полностью отнести за счет какого-либо одного соединения, фармакокинетические исследования многокомпонентных растительных препаратов, в том числе СЕПТИЛИН ПЛЮС, неосуществимы.

Показания

Риносинусит (острый, обострение хронического). Обострение хронического тонзиллофарингита.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-14 дней. В случае неполного купирования симптомов заболевания лечение может быть продолжено до 4 недель в дозе по 1 таблетке 2 раза в день или по усмотрению врача. В случае появления нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта доза препарата может быть снижена до 1 таблетки 2 раза в день. В случае, если снижение дозы не приводит к купированию симптомов, рекомендуется отмена препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости применения в период грудного вскармливания грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, ощущение сухости во рту, диспепсические явления (тошнота, диарея, метеоризм), абдоминальные боли, транзиторное повышение активности "печеночных" трансаминаз. При проявлении побочных эффектов, неописанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют. В случае передозировки применяется симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение препарата не исключает возможность применения других лекарственных средств, в том числе антибактериальных препаратов.

Особые указания

При прекращении приема препарата СЕПТИЛИН ПЛЮС в лекарственной форме таблетки о возникновении синдрома "отмены" не сообщалось. Специальных мер при пропуске одной или нескольких доз препарата не требуется. В случае, если пациент один или несколько раз пропускает прием лекарственного средства, следует продолжать прием препарата по рекомендованной в инструкции схеме, не удваивая дозы. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного средства не требуется.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера /оператора и другое) не сообщалось.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.