# Инструкция по применению
# Септофемин Таблетки вагинальные 10 мг 6 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алиум
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Деквалиния хлорид
Количество в упаковке: 1




## Описание

Двояковыпуклые таблетки овальной формы без риски, белого или почти белого цвета.

## Действующее вещество

Деквалиния хлорид

## Состав

1 таблетка содержит: действующее вещество: деквалиния хлорид - 10 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

При интравагинальном введении крайне незначительное количество деквалиния хлорида всасывается через слизистую оболочку влагалища в системный кровоток, метаболизируется до производного 2,2-дикарбоновой кислоты и выводится в неконъюгированной форме через кишечник.

**Показания**

Бактериальный вагиноз кандидозный вагинит трихомонадный вагинит санация влагалища перед гинекологическими операциями и родами

**Способ применения и дозы**

Только для интравагинального применения. Рекомендуемый режим дозирования - 1 вагинальная таблетка в сутки. Вагинальную таблетку вводят глубоко во влагалище вечером перед сном, лежа на спине, слегка согнув ноги. Курс лечения 6 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к деквалинию хлориду и другим компонентам препарата. Язвенные поражения эпителия влагалища и шейки матки. Не рекомендуется применение деквалиния хлорида до начала половой жизни.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат разрешен к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Крайне редко могут наблюдаться местные реакции раздражения (эрозии), зуд, жжение или покраснение слизистой оболочки влагалища. Однако эти нежелательные реакции также могут быть связаны с симптомами вагинальной инфекции. Крайне редко - лихорадка, аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном приеме препарата внутрь возможно усиление побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом. Септофемин несовместим с мылом и другими анионными поверхностно-активными веществами.

**Особые указания**

Препарат содержит вспомогательные вещества, которые иногда не полностью растворяются во влагалище. Поэтому остатки вагинальной таблетки можно обнаружить на нижнем белье. На эффективность препарата это не влияет. В редких случаях, при чрезмерной сухости влагалища, есть вероятность, что таблетка останется нерастворенной. Для предотвращения этого, перед тем, как вводить вагинальную таблетку, ее необходимо смочить водой (в течение 1 секунды под струей воды). В период лечения рекомендуется чаще менять прокладки и нижнее белье. Если клинические признаки инфекции сохраняются после завершения лечения, следует провести повторное микробиологическое исследование для выявления возбудителя и подтверждения диагноза. В период лечения препаратом рекомендуется воздержаться от половых контактов. Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров. При лечении вагинальных инфекций препарат нельзя применять во время менструации, лечение целесообразно начинать после менструации.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и т. п.).

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.