Инструкция по применению
Септолете пастилки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Пастилки
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензалкония хлорид+Мяты перечной листьев масло+Тимол+Эвкалипта прутовидного листьев масло+Левоментол
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 1 мг+1.2 мг+1 мг+600 мкг+600 мкг
Срок годности: 24

Действующее вещество

Бензалкония хлорид+Мяты перечной листьев масло+Тимол+Эвкалипта прутовидного листьев масло+Левоментол

Состав

Бензалкония хлорид 1 мглевоментол 1.2 мгмасло мяты перечной 1 мгмасло эвкалиптовое 600 мкгтимол 600 мкгВспомогательные вещества: лактозы моногидрат, парафин жидкий, глицерол, касторовое масло, пеногаситель 1510, сорбитол, декстроза (глюкоза) жидкая (сухое вещество), магния стеарат, краситель хинолиновый желтый (E104), индигокармин синий краситель (E132), титана диоксид (E171), повидон, воск эмульсионный, сахароза.

Форма выпуска

Пастилки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:— фарингиты, ларингиты, тонзиллит;— воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

Способ применения и дозы

Медленно рассасывать (до полного растворения) в полости рта по 1 пастилке каждые 2-3 ч.Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать до 8 пастилок/сут.Детям в возрасте старше 4 лет рекомендуется принимать до 4 пастилок /сут.Детям в возрасте старше 10 лет рекомендуется принимать до 6 пастилок/сут.Не следует принимать пастилки непосредственно перед приемом пищи и вместе с молоком.

Противопоказания

— детский возраст до 4-х лет;— дефицит фермента лактазы, галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы, дефицит фермента изомальтазы, врожденная непереносимость фруктозы;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по рекомендации врача.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея.Прочие: возможны аллергические реакции (у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата).

Передозировка

Возможность передозировки минимальна.Симптомы: тошнота, рвота и диарея. Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Бензалкония хлорид не рекомендуется применять с другими антисептиками, предназначенными для рассасывания в полости рта.

Особые указания

Пациентов с сахарным диабетом следует информировать о том, что в каждой пастилке содержится 174.5 мг сахара (сахароза, глюкоза).Рекомендуется воздерживаться от одновременного приема Септолете; с молоком, т.к. молоко снижает антисептическую активность бензалкония хлорида.В 1 пастилке содержится 218 мг лактозы, 623.575 мг сахарозы, 152.7 мг сорбитола, поэтому препарат не следует принимать пациентам с дефицитом лактазы, дефицитом сахаразы /изомальтазы, галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы или врожденной непереносимостью фруктозы, т.к. это может вызвать нарушения пищеварения.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПастилки не оказывают воздействия на способность управлять автомобилем и другими механическими средствами.

Условия хранения

В сухом месте