Инструкция по применению
Септолете® тотал Таблетки для рассасывания эвкалипт 3 мг + 1 мг 16 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Словения
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензидамин+Цетилпиридиния хлорид
Количество в упаковке: 16
Дозировка действующего вещества: 4 мг
Срок годности: 24.0

Описание

Препарат представляет собой круглые таблетки со скошенными краями с шероховатой поверхностью от светло-голубого до голубого цвета. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. По 8 таблеток в блистере из комбинированного материала ПВХ/полиэтилена/ПВДХ - фольги алюминиевой. По 1, 2, 3 или 4 блистера помещают в пачку картонную вместе с листком-вкладышем. Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Действующее вещество

Бензидамин+Цетилпиридиния хлорид

Состав

Действующими веществами являются: бензидамин + цетилпиридиния хлорид. Каждая таблетка содержит 3 мг бензидамина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридиния хлорида (в виде моногидрата). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: эвкалипта прутовидного листьев масло, левоментол, сукралоза (Е955), лимонная кислота (Е330), изомальт (тип М) (Е953), краситель бриллиантовый голубой (Е133). См. раздел 2 листка-вкладыша «Препарат Септолете® тотал содержит изомальт (Е953)».

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

Препарат Септолете® тотал показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 лет. • Симптоматическая терапия болевого синдрома воспалительных заболеваний полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии), в том числе тонзиллитов, фарингитов, в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Рекомендуемая доза для взрослых и пациентов пожилого возраста: 3–4 таблетки для рассасывания в сутки. Применение у детей и подростков Рекомендуемая доза для подростков в возрасте от 12 лет до 18 лет: 3–4 таблетки для рассасывания в сутки. Рекомендуемая доза для детей в возрасте от 6 лет до 12 лет: 3 таблетки для рассасывания в сутки. Способ применения Таблетку следует медленно рассасывать во рту каждые 3–6 часов. Не следует превышать указанную дозу. Для достижения оптимального эффекта не рекомендуется применять препарат непосредственно до или после чистки зубов. Продолжительность применения Препарат Септолете® тотал не следует применять более 7 дней.

Противопоказания

Не применяйте препарат Септолете® тотал: • если у Вас аллергия на бензидамин, цетилпиридиния хлорид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша). Если утверждение относится к Вам (или у Вас есть сомнения), обязательно сообщите об этом лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Перед применением препарата Септолете® тотал необходимо проконсультироваться с врачом. Грудное вскармливание Если Вы кормите грудью или планируете грудное вскармливание, перед применением препарата Септолете® тотал проконсультируйтесь с врачом. Врач примет решение о прекращении грудного вскармливания либо об отмене препарата Септолете® тотал.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Септолете® тотал может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите применение препарата Септолете® тотал и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появится любая из следующих серьезных нежелательных реакций: Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): • внезапное свистящее дыхание, боль в груди, одышка или затрудненное дыхание (бронхоспазм); • зуд, покраснение кожи с появлением пузырей и волдырей (крапивница). Неизвестно (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно): • аллергические реакции, в том числе анафилактическая реакция (ангионевротический отек): может проявляться отеком лица, губ, языка и горла и затруднением дыхания и глотания. Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Септолете® тотал: Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): • повышенная чувствительность кожи на воздействие солнца (фотосенсибилизация). Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): • раздражение слизистой оболочки полости рта; • чувство жжения в полости рта. Неизвестно (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно): • онемение слизистой оболочки полости рта; • кожный зуд.

Передозировка

Если Вы применили препарата Септолете® тотал больше, чем следовало, немедленно проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Особые указания

Перед применением препарата Септолете® тотал проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки: • если у Вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные противовоспалительные препараты (не рекомендуется применение препарата у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте); • если у Вас бронхиальная астма (был поставлен ранее диагноз).

Срок хранения после открытия

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до:» Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Условия хранения

В сухом месте