Инструкция по применению
Септолете тотал таблеткидля рассасывания N8

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Словения
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Бензидамин+Цетилпиридиния хлорид
Количество в упаковке: 8
Дозировка действующего вещества: 4 мг



Описание

Таблетки Септолете тотал для рассасывания - нестероидный противовоспалительный препарат + антисептическое средство. Бензидамин - нестероидное противовоспалительное средство, обладающее противовоспалительным, обезболивающим и местноанестезирующим действием. Цетилпиридиния хлорид - антисептик из группы четвертичных аммониевых соединений, оказывает противомикробное, противогрибковое, вирулицидное действие.

Действующее вещество

Бензидамин+Цетилпиридиния хлорид

Состав

Действующие вещества: гидрохлорид бензидамина - 3,000 мг, моногидрат цетилпиридиния хлорида - 1,050 мг. Вспомогательные вещества: масло листьев прутовидного эвкалипта, левоментол, сукралоза (E955), лимонная кислота (E330), изомальт (тип М) (E953), бриллиантовый голубой краситель (E133).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

Симптоматическая терапия болевого синдрома воспалительных заболеваний полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии).

Способ применения и дозы

Таблетки следует медленно рассасывать во рту каждые 3-6 часов.Взрослые и пациенты пожилого возраста: рекомендованная доза составляет 3-4 таблетки сутки.Не следует превышать указанную дозу.Для достижения оптимального эффекта не следует применять препарат Септолете тотал непосредственно до или после чистки зубов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Септолете тотал при беременности и в период грудного вскармливания возможно только после консультации с лечащим врачом, в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): очень часто ⩾ 1/10, часто - от ⩾ 1/100 до < 1/10, нечасто - от ⩾ 1/1000 до < 1/100, редко - от ⩾ 1/10000 до < 1/1000, очень редко < 1 /10000, частота неизвестна - не может быть оценена на основе имеющихся данных. Нарушения со стороны иммунной системы. Редко: реакции повышенной чувствительности. Частота неизвестна: анафилактические реакции.Нарушения со стороны нервной системы. Частота неизвестна: онемение слизистой оболочки полости рта. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Редко: бронхоспазм.Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Очень редко: раздражение слизистой оболочки полости рта, чувство жжения в полости рта.Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей. Редко: крапивница, фотосенсибилизация. Частота неизвестна: ангионевротический отек, кожный зуд.

Передозировка

Симптомы: токсические проявления передозировки бензидамина включают: возбуждение, судороги, повышенное потоотделение, атаксию, озноб и рвоту . Признаки и симптомы интоксикации при приеме внутрь значительных количеств цетилпиридиния хлорида включают: тошноту, рвоту, отек, цианоз, асфиксию с последующим параличом дыхательных мышц, угнетение центральной нервной системы, артериальную гипотензию и кому .Смертельная доза для человека составляет около 1-3 г.Лечение: ввиду отсутствия специфического антидота, лечение острой интоксикации бензидамином симптоматическое. Лечение передозировки цетилпиридиния хлорида также симптоматическое. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось. Следует избегать одновременного применения с другими препаратами из группы антисептиков.

Особые указания

Противопоказания: повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам, бронхиальная астма (в т. ч. в анамнезе), беременность и период грудного вскармливания, детский возраст (до 12 лет). Препарат Септолете тотал не следует применять более 7 дней. При отсутствии заметных признаков улучшения состояния следует обратиться к врачу. При применении препарата Септолете тотал возможно развитие реакций гиперчувствительности. В этом случае рекомендуется прекратить лечение и проконсультироваться с врачом для назначения соответствующей терапии. При наличии язвенного поражения слизистой оболочки ротоглотки, пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются в течение более трех дней. Применение препарата Септолете тотал не рекомендуется у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам. Препарат Септолете тотал не следует применять одновременно с анионными соединениями (например, присутствуют в зубной пасте). Поэтому не рекомендуется применение препарата непосредственно до или после чистки зубов.Одновременный прием с молоком может снизить противомикробное действие цетилпиридиния хлорида, поэтому препарат Септолете тотал не следует применять одновременно с молоком.