Инструкция по применению
Сертамикол раствор 2 % 15 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сертаконазол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%
Срок годности: 24

Действующее вещество

Сертаконазол

Состав

100 мл сертаконазола нитрат 2 г. Вспомогательные вещества: (пропиленгликоль - 102 г, троламин - 0.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При наружном применении сертаконазол в крови и в моче не обнаруживается. В ходе фармакокинетического исследования множественных доз с участием пациентов с межпальцевой дерматофитией стоп (диапазон площади пораженной области: 42-140 см2; среднее - 93 см2), раствор применяли наружно каждые 12 ч (всего 13 раз) на пораженную кожу (0.5 г сертаконазола нитрата на 100 см2). Концентрация сертаконазола в плазме, измеренная по серии проб крови, взятых в течение 72 часов после тринадцатой дозы, была ниже предела количественного определения (2.5 нг /мл) использованного аналитического метода.

Показания

Лечение поверхностных микозов кожи: — дерматомикозов - Tinea pedis (стопа атлета), Tinea crusis (дерматомикоз паховый), Tinea corporis (микоз гладкой кожи), Tinea barbae (микоз бороды), Tinea manus (дерматофития кистей) — кандидоза (Monolisiasis) — Pityiriasis versicolor (Pityrosporum orbiculare) (отрубевидный (разноцветный лишай)). Отрубевидный лишай у иммунокомпетентных пациентов старше 12 лет (раствор для наружного применения).

Способ применения и дозы

Наружно. Крем для наружного применения Взрослым крем наносят на пораженные участки кожи равномерным тонким слоем 2 раза/сут, захватывая примерно 1 см поверхности здоровой кожи. Перед применением препарата кожу в месте нанесения необходимо очистить с помощью воды и мыла, просушить. Продолжительность лечения зависит от этиологии (возбудителя) и локализации инфекции, в среднем - 4 недели. Раствор для наружного применения Взрослым и детям страше 12 лет раствор для наружного применения наносят на пораженные участки кожи равномерным тонким слоем 2 раза/сут, захватывая примерно 1 см поверхности здоровой кожи. Продолжительность лечения зависит от этиологии (возбудителя) и локализации инфекции, в среднем - 4 недели. При лечении отрубевидного лишая следует нанести достаточное количество раствора для наружного применения на сухую кожу от шеи вниз, исключая половые органы. Повторять дважды в день в течение 4 недель.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к сертаконазолу и другим компонентам препарата, в т.ч. к другим производным имидазола — период лактации — детский возраст до 12 лет (раствор для наружного применения).

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В период лактации препарат не следует наносить на область молочных желез. При необходимости применения препарата в период лактации следует рассмотреть вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Местные реакции: контактный дерматит, возможны быстро проходящие эритематозные реакции в месте применения, что не требует отмены препарата. Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются, либо возникли любые другие побочные эффекты, пациент должен сообщить об этом врачу.

Передозировка

Учитывая способ применения, Передозировка препаратом маловероятна. При случайном приеме препарата внутрь необходимо провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено.

Особые указания

Не использовать в офтальмологической практике. После нанесения препарата не рекомендуется использование кислотных моющих средств (в кислой среде усиливается размножение Candida spp.). Использование в педиатрии Данных о применении препарата у детей нет. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Применение препарата в соответствии с инструкцией по применению не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управления автомобилем, работы с движущимися механизмами).

Условия хранения

В сухом месте