Инструкция по применению
SFM Шприц 3-х компонентный с иглой 23G Луер-Лок 0,6 х 30 мм 2 мл 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Шприц
Страна: Германия
Производитель: СФМ Хоспитал
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Шприц 2 мл Luer Lock трёхкомпонентный с надетой иглой 0,6 х 30 - 23G SFM 100 штук. Шприцы трехкомпонентные одноразовые применяют для выполнения подкожных, внутримышечных инъекций и других лечебно-диагностических мероприятий.Шприц состоит из трех частей: цилиндр, поршень, манжета на поршне.Трехкомпонентные шприцы изготовлены из специального полипропилена.Безболезненность инъекции обуславливается легким скольжением поршня, без трения.Удерживающее кольцо на поршне предотвращает потерю медикамента, а точная градуировка на шприце позволяет легко считывать показания.Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования.Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства.Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем - плотная мед. бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен / полиамид).Упаковка должна вскрываться без образования бумажной бахромы.Нетоксичен, апирогенен.Метод стерилизации - этилен оксид.

Форма выпуска

Шприц

Показания

Предназначены для инъекций.

Способ применения и дозы

1. Проверьте целостность индивидуальной упаковки и наличие производственных дефектов.2. Убедитесь, что срок годности шприца не истек.3. Вскройте индивидуальную упаковку, извлеките шприц.4. Плотно наденьте иглу на наконечник шприца, если она не надета. Проверьте плотность соединения иглы со шприцем.5. Приведите положение штока-поршня к нулевой отметке.6. Снимите с иглы предохранительный колпачок. Игла не должна контактировать с кожей и другими нестерильными предметами.7. Наберите в шприц лекарственное средство.8. Расположите шприц вертикально, иглой вверх и выдавите, нажимая на шток-поршень, пузырьки воздуха.9. Проведите инъекцию.10. После проведения инъекции поместите предохранительный колпачок на иглу и утилизируйте шприц с иглой соответствующим образом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов продукта

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 0С.