Инструкция по применению
Шалфей Таблетки для рассасывания 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Нидерланды
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Шалфея лекарственного листьев экстракт
Количество в упаковке: 10



Описание

Таблетки плоские круглые со скошенным краем, голубовато-зелёного цвета с более светлыми и более тёмными вкраплениями, со специфическим запахом. На обеих сторонах таблетки гравировка "NP" на фоне дерева.

Действующее вещество

Шалфея лекарственного листьев экстракт

Состав

На одну таблетку: Активные вещества: Шалфея экстракт сухой 12,50 мг Шалфея масло эссенциальное 2,40 мг Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота, яблочная кислота, сорбит, аспартам, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, ароматизатор медовый, хинолиновый жёлтый Е-104, индигокармин Е-132.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

В комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ангина, ларингит, фарингит) и полости рта (стоматит, гингивит).

Способ применения и дозы

Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая. - Взрослые и подростки старше 15 лет: 6 таблеток в день с интервалом в 2 часа. - Дети с 10 до 15 лет: 4 таблетки в день с интервалом 3 часа. - Дети с 5 до 10 лет: 3 таблетки в день с интервалом 4 часа. Длительность терапии 5-7 дней.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 5 лет, острый нефрит, непереносимость фруктозы, фенилкетонурия.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов,не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Прием препаратов шалфея может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через ГАМКрецепторы (например, барбитураты, бензодиазепины). Одновременное применение с данными лекарственными средствами не рекомендовано. Препараты шалфея могут взаимодействовать с гипогликемическими и противосудорожными средствами, усиливать седативное действие других лекарственных средств и алкоголя. Лекарственное средство может влиять на всасывание железа и других минералов.

Особые указания

При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 5-7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!