Инструкция по применению
Шиповника Масло для приема внутрь 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Шиповника семян масло
Количество в упаковке: 1



Описание

Маслянистая жидкость оранжевого цвета, со специфическим запахом. Допускается незначительный осадок, растворяющийся при температуре 40 °С.

Действующее вещество

Шиповника семян масло

Состав

Шиповника семян масло. Характеристика Шиповника масло содержит жирорастворимые витамины: каротиноиды, витамины К1 и Е.

Форма выпуска

Масло

Показания

Шиповника масло применяют наружно или местно при неглубоких трещинах и ссадинах сосков у кормящих женщин, пролежнях, трофических язвах голени, дерматозах, озене, при неспецифическом язвенном колите (в комплексной терапии). При дерматозах наряду с наружным применением масло шиповника применяется внутрь.

Способ применения и дозы

При лечении трещин и ссадин сосков молочных желез у кормящих женщин марлевые салфетки, смоченные маслом шиповника, накладывают на соски на 20-30 минут после каждого кормления ребенка в течение 4-5 дней. При лечении пролежней и трофических язв голеней и стоп на очаг поражения накладывают марлю, пропитанную маслом шиповника, затем закрывают вощеной бумагой и фиксируют повязку бинтом. Курс лечения 15-20 дней. При лечении дерматозов на пораженные участки кожи 2-3 раза в день накладывают марлевую салфетку, пропитанную маслом шиповника, под окклюзивную повязку. Кроме того, препарат применяют внутрь по 1 чайной ложке 2 раза в день. Курс лечения 1-2 месяца. При озене 2 раза в день в полость носа вводят тампоны, пропитанные маслом шиповника. Курс лечения 20-30 дней. При комплексной терапии неспецифического язвенного колита масло шиповника вводят в прямую кишку при помощи клизм по 50 мл ежедневно или через день. Курс лечения 15-30 процедур.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. При применении внутрь - беременность, детский возраст до 12 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов, диарея.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.