Инструкция по применению
Шприц 5 мл трехдетальный стерильный однократного применения Луер с иглой 0,7х40 мм 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Шприц
Страна: Россия
Производитель: МПК Елец
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1





Описание

Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения Технические характеристики: Стерильный, апирогенный Однократный Трехдетальный Игла (нержавеющая сталь) Заточка иглы трехгранная копьевидная Соединение шприца с иглой: тип Луер Шток поршня имеет 4 ребра жесткости Уплотнитель имеет 2 кольца контакта с внутренней поверхностью шприца и покрыт силиконовой смазкой Потребительская упаковка (БГС+пленка полиамид) Срок годности пять летОсобенности: Уплотнитель поршня не содержит латекса Цилиндр полностью прозрачен Четкая несмываемая градуировка Упоры для пальцев на цилиндре и поршне с противоскользящим рельефом

Состав

Материал изготовления:Цилиндр шприца: медицинский полипропиленШток-поршень, шток: медицинский полипропилен/полиэтилен.Манжета (уплотнитель): ПВХ.Смазка: жидкость полиметилсилоксановая.Уплотнитель поршня НЕ содержит латекса

Форма выпуска

Шприц

Показания

Предназначен для подкожного, внутримышечного, внутривенного введения лекарственных средств.

Способ применения и дозы

Порядок применения (инструкция по применению):Провести дезинфекцию кожи в месте инъекции. Дезинфекцию кожи проводить этиловым или метиловым спиртом. Цена деления шкалы позволяет устанавливать дозу лекарственного вещества с требуемой точностью.1. Перед применением визуальным осмотром проверить целостность потребительской упаковки. Шприц из поврежденной упаковки использовать запрещается.2. Проверить срок годности изделия. Запрещается использование изделия после окончания срока годности.3. Вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь шприц.4. Плотно одеть на конус шприца иглу, снять колпачок.5. Набрать в шприц лекарственный препарат.6. Расположить шприц иглой вертикально вверх, выдавить, нажимая на шток-поршень, пузырьки воздуха.7. Сделать инъекцию.8. После инъекции снять иглу со шприца и поместить в контейнер для сбора и утилизации игл.9. Утилизировать шприц и иглу.

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний применения шприца инъекционного не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов изделия.

Особые указания

Места для безопасных внутримышечных инъекций: верхний наружный квадрант на ягодице, средняя треть переднебоковой поверхности бедра и верхняя треть наружной поверхности плеча.Правильный выбор длины и толщины иглы является важным и значимым моментом при внутримышечном, подкожном или внутривенном введении лекарственных препаратов. Размер иглы выбирается в зависимости от следующих показателей:1) Физическое состояние человека (вес, пол, возраст, рост).2) Места инъекций.3) В зависимости от концентрации и состава лекарственного препарата.

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.