Инструкция по применению
SFM Шприц 3-х компонентный инсулиновый U-40 1 мл 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Шприц
Страна: Германия
Производитель: СФМ Хоспитал
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Бренд SFM Hospital Products GmbH (Германия)Шприц инъекционный инсулиновый SFM 1,0 мл, (шкала U-40) - применяют для инъекций инсулинаСтерильный. Стерильно, апирогенно, нетоксично, однократного применения.ОдноразовыйТрехкомпонентный с резиновой манжетой на поршне для обеспечения исключительной плавности введения препаратов (черная манжета так же позволяет контролировать забор лекарства до необходимого объема),Безболезненность инъекции обуславливается легким скольжением поршня, без трения.Игла 29G (нержавеющая сталь) - игла съёмная, надета на шприцИнъекционная игла имеет трёхгранную заточку острия, обеспечивающую легкий и комфортный прокол тканиСоединение шприца с иглой - тип LuerПоложение луер-крепления (конуса цилиндра) шприца - концентрическоеНестираемая градуировка (четкая, контрастная)- способствует максимально точной дозировке,Градуировка на шприце выполнена в единицах инсулина и позволяет легко считывать показания.Цветовая кодировка иглы, т.е. пластиковое основание иглы определенного диаметра должно иметь определенный цвет (коричневый)Удерживающее кольцо на поршне предотвращает потерю медикамента.Цилиндр полностью прозрачен обеспечивает отличную визуализацию содержимого шприца,Запрещается использовать шприцы и иглы повторно. Стерильность нарушается при снятии колпачка с иглы.Упаковка - блистер

Состав

Материал цилиндра и поршня - медицинский полипропиленУплотнитель поршня (манжета) НЕ содержит латексаСтерилизация: оксид этилена, CE маркировка

Форма выпуска

Шприц

Показания

Применяют для инъекций инсулина

Способ применения и дозы

1. Проверьте целостность индивидуальной упаковки и наличие производственных дефектов.2. Убедитесь, что срок годности шприца не истек.3. Вскройте индивидуальную упаковку, извлеките шприц.4. Плотно наденьте иглу на наконечник шприца, если она не надета. Проверьте плотность соединения иглы со шприцем.5. Приведите положение штока-поршня к нулевой отметке.6. Снимите с иглы предохранительный колпачок. Игла не должна контактировать с кожей и другими нестерильными предметами.7. Наберите в шприц лекарственное средство.8. Расположите шприц вертикально, иглой вверх и выдавите, нажимая на шток-поршень, пузырьки воздуха.9. Проведите инъекцию.10. После проведения инъекции поместите предохранительный колпачок на иглу и утилизируйте шприц с иглой соответствующим образом.Техника инъекций:Необходимо сформировать кожную складку, так как высок риск введения инсулина внутримышечно (на каждой индивидуальной упаковке шприцев приведена подробная инструкцию по применению и технике инъекций).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Особые указания

Пациентам, смешивающим два вида инсулина, НЕЛЬЗЯ:изменять предписанную врачом последовательность смешивания,изменять модель или марку шприцев или иглы без предварительной консультации с лечащим врачом.Использовать шприцы исключительно по назначению, т.е. только для введения лекарств.Для одноразового использования.После употребления удалить иглу и шприц в качестве отходов надлежащим образом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше +25оС.