Инструкция по применению
SFM Шприц одноразовый 3-х компонентный 10 мл 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Шприц
Страна: Россия
Производитель: СФМ Хоспитал
Количество в упаковке: 100



Описание

Шприцы отличаются плавным и мягким ходом поршня, поэтому им отдают предпочтение в тех отраслях медицины, где необходимо медленное внутривенное введение препаратов (анестезиология, интенсивная терапия, служба скорой и неотложной медицинской помощи, медицина катастроф).Шприцы применяют в анестезиологии, при проведении интенсивной терапии, в онкологии, неонатологии, когда необходимо медленное дозированное введение лекарственных препаратов в небольших объемах в течение нескольких часов или суток.Шприц стерильный инъекционный однократного применения SFM Hospital Products GmbH 10 млСтерильныйОдноразовыйТрехкомпонентныйИгла съёмная, надетая на шприцИнъекционная игла имеет трёхгранную заточку острия, обеспечивающую легкий и комфортный прокол тканиСоединение шприца с иглой - тип LuerПоложение луер-крепления (конуса цилиндра) шприца - концентрическоеПоверхность иглы становится гладкой в результате полировки и шлифовки, а также покрытия специальной смазкой. Игла при введении не травмирует тканиТонкостенная конструкция иглы позволяет комфортно вводить густые и масляные лекарстваОбъем шприца 10 млШкала имеет градуировку до 10 млСтопорное кольцо исключает случайное извлечение поршня из цилиндра и вытекание лекарства для внутримышечных инъекцийУпаковка - блистерОбщая вместимость шприца несколько превышает номинальный объем (не менее, чем на 10 %)Прозрачный цилиндр облегчает контроль объема и прозрачности медикаментаИндивидуальная упаковка обеспечивает сохранность стерильности.

Состав

Пластик, металл

Форма выпуска

Шприц

Показания

Шприц предназначен для всех видов инъекций в условиях стационара, амбулаторных и домашних условиях. Используется для внутривенного и внутримышечного введения, инъекционных лекарственных препаратов.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Дезинфекция кожи проводится этиловым или метиловым спиртом. Цена деления шкалы позволяет устанавливать дозу лекарственного вещества с требуемой точностью.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Особые указания

Однократного применения шприц позволяет повысить профилактику перекрестной инфекции (в том числе гепатита), а также распространения внутрибольничной инфекции. Шприцы по токсико-гигиеническим и санитарно-химическим показателям соответствуют всем требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям данного класса.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.