Инструкция по применению
Сиалор (спрей) 2% 10 мл таблетка + растворитель

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Серебра протеинат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%
Срок годности: 24

Описание

Сиалор — оригинальный* лекарственный препарат для лечения насморка (в том числе затяжного) у детей с 6 лет и взрослых. Он действует на причину насморка, тем самым лечит его, а не просто маскирует симптомы. Сиалор подавляет рост бактерий, уменьшает воспаление и отёк, что улучшает носовое дыхание. Сиалор не вызывает привыкания. Хранится при комнатной температуре. Состав без антибиотиков, без гормонов и без консервантов.Спрей мягко распыляет препарат на слизистую носа.* Компания АО «ПФК Обновление» первой создала стабильную таблетированную форму серебра протеината.

Действующее вещество

Серебра протеинат

Состав

Состав на одну таблетку:Действующее вещество: Серебра протеинат – 200 мгВспомогательное вещество: повидон К 30 – 20 мг1 ампула растворителя содержит: вода

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется

Показания

Симптоматическая терапия острого назофарингита, синусита; острый ринит (насморк)

Способ применения и дозы

Местно, в виде 2 % раствора. Приготовление раствора проводить непосредственно перед применением. Для приготовления 2 % раствора 1 таблетку препарата (200 мг) растворяют в 10 мл растворителя (вода). Перед применением препарата рекомендуется промыть и очистить носовые ходы. Для формы выпуска, включающей насадку-распылитель: Взрослым и детям старше 6 лет – по 1-2 орошения слизистой оболочки полости носа 3 раза в день в течение 5-7 дней. Если через 7 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период лактации, атрофический ринит, детский возраст до 6-ти лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан во время беременности и кормящим матерям, при необходимости применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Легкое раздражение слизистой оболочки, жжение, зуд, аллергические реакции (крапивница, атопический дерматит, отек Квинке, анафилактический шок). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом к врачу.

Передозировка

При рекомендуемом способе применения передозировка маловероятна. Симптомы: возможно усиление побочных эффектов. При случайном проглатывании большого количества препарата может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. Лечение: при сильном раздражении, жжении, зуде слизистые оболочки промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармакодинамическое, фармакокинетическое взаимодействие: не изучено. Фармацевтическое взаимодействие: соли цинка, меди, свинца, серебра, ртути, железа, алюминия образуют с раствором препарата нерастворимые осадки; раствор препарата инактивируется солями алкалоидов и органическими основаниями (эпинефрин). Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Возможно окрашивание отделяемого из носа в серый или синий цвет

Срок хранения после открытия

Готовый раствор хранить при комнатной температуре. Раствор использовать в течение 30 дней после приготовления.

Условия хранения

Хранить в контурной ячейковой упаковке в пачке для защиты от света при температуре ниже 30 °С. Готовый раствор хранить при комнатной температуре не более 30 дней после приготовления. Хранить в недоступном для детей месте.