Инструкция по применению
Силимар Таблетки 100 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вилар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Силибинин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 60.0



Действующее вещество

Силибинин

Состав

Действующее вещество: Экстракт плодов расторопши пятнистойКонцентрация действующего вещества (мг): 100

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Гепатиты различного генеза, цирроз печени, токсические поражения печени (в том числе лекарственные, алкогольные, соединениями тяжелых металлов), жировой гепатоз.

Способ применения и дозы

Силимар применяют у взрослых и детей старше 12 лет внутрь по 1-2 таблетки 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – от 25 дней до 1,5 месяцев. При хронических заболеваниях целесообразны повторные курсы лечения через 1-3 месяца.В профилактических целях Силимар рекомендуется принимать при хронических интоксикациях (в том числе профессиональных), длительном приеме лекарств и алкоголя.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется назначать препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно - аллергические реакции.В отдельных случаях - послабляющее действие.

Передозировка

Данные о передозировке препарата Силимар не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Силимар не предоставлены.

Особые указания

Использование в педиатрииНе рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 12 лет.

Условия хранения

В сухом месте