Инструкция по применению
Симеотик Капсулы 40 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Симетикон
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 40 мг

Описание

Шарообразные или почти шарообразные мягкие желатиновые капсулы от желтого до оранжевого цвета со швом и гладкой поверхностью. Содержимое капсул - бесцветная, вязкая, опалесцирующая жидкость.

Действующее вещество

Симетикон

Состав

Состав на одну капсулу:Действующее вещество:Симетикон* (Диметикона (полидиметилсилоксана)) 40,0 мгКремния диоксид 38,05 мгВспомогательные вещества оболочки:Желатин 24,670 мгГлицерин 11,360 мгВода очищенная 3,140 мгНатрия бензоат 0,047 мгКраситель хинолиновый желтый Е-104 0,027 мгКраситель солнечный закат желтый Е-110 0,007 мг*симетикон представляет собой смесь диметикона (полидиметилсилоксана) и кремния диоксида в соотношении 95:5,

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

симетикон химически инертен, после перорального приема не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и действует только в его просвете. Не влияет на ферменты и микроорганизмы, присутствующие в ЖКТ. Выводится в неизмененном виде.

Показания

Избыточное образование и скопление газов в ЖКТ (метеоризм, синдром Ремхельда, аэрофагия, повышенное газообразование в послеоперационном периоде), Подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (ультразвуковые, рентгенологические исследования и др.), Симптомы избыточного газообразования, вызванного функциональной диспепсией, Острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (в качестве пеногасителя).

Способ применения и дозы

При жалобах, связанных с избыточным газообразованием: Взрослым и детям старше 6 лет по 2 капсулы 40 мг или по 1 капсуле 80 мг 3-5 раз в сутки, можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном. Продолжительность курса лечения зависит от наличия симптомов повышенного газообразования. При необходимости препарат симетикон можно применять в течение длительного периода времени. Подготовка к диагностическим исследованиям: по 2 капсулы 40 мг или по 1 капсуле 80 мг 3 раза в сутки за день до исследования, 2 капсулы 40 мг или 1 капсула 80 мг утром в день исследования, не запивая водой. В качестве пеногаеителя при отравлениях моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества: разовая доза для взрослых составляет 10-20 капсул 40 мг или 5-10 капсул 80 мг, для детей старше 6 лет 3-10 капсул 40 мг или 2-5 капсул 80 мг в один прием, дозирование зависит от тяжести интоксикации. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, Кишечная непроходимость, Детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат симетикон можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Передозировка препарата симетикон маловероятна из-за химической и физиологической инертности препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия препарата симетикон с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

У людей с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно возникновение реакций гиперчувствительности немедленного типа, а также реакций гиперчувствительности замедленного типа. При возникновении любых аллергических реакций прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться к врачу. В случае сохранения избыточного газообразования в течение длительного времени необходимо обратиться к врачу для проведения медицинского обследования.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25оС. Хранить в недоступном для детей месте.