Инструкция по применению
Симетикон Капсулы 40 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Симетикон
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 40 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 3 с корпусом и крышечкой фиолетового цвета, непрозрачные. Содержимое капсул - белые или почти белые сферические пеллеты.

Действующее вещество

Симетикон

Состав

Одна капсула содержит: Действующее вещество: симетикон, пеллеты 80 мг. Состав пеллет: действующее вещество: симетикон * - 40,0 мг, вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза - 24,0 мг, кремния диоксид (аэросил) - 1,6 мг, маннитол - 12,0 мг, натрия гидрофосфат - 2,4 мг. Капсула твердая желатиновая № 3: титана диоксид (Е171) - 1,0000 %, краситель азорубин (Е122) - 0,1395 %, краситель железа оксид черный (Е172) - 0,7846 %, желатин - до 100, 0000 %. * Симетикон представляет собой смесь диметикона (полидиметилсилоксана) и кремния диоксида в соотношении 95:5.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Симетикон химически инертен, после перорального приема не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и действует только в его просвете. Не влияет на ферменты и микроорганизмы, присутствующие в ЖКТ. Выводится в неизменном виде.

Показания

Избыточное образование и скопление газов в ЖКТ (метеоризм, синдром Ремхельда, аэрофагия, повышенное газообразование в послеоперационном периоде), подготовка к диагностическим процедурам органов брюшной полости и малого таза (ультразвуковые, рентгенологические исследования и др.), симптомы избыточного газообразования, вызванного функциональной диспепсией, острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (в качестве пеногасителя).

Способ применения и дозы

При жалобах, связанных с избыточным газообразованием: Взрослым и детям старше 6 лет по 2 капсулы 3-5 раз в сутки, можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и при необходимости перед сном. Продолжительность курса лечения зависит от наличия симптомов повышенного газообразования. При необходимости препарат можно применять в течение длительного периода времени. Подготовка к диагностическим исследованиям: по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, и утром в день исследования 2 капсулы, не запивая водой. В качестве пеногасителя при отравлениях моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества: разовая доза для взрослых составляет 10-20 капсул, для детей старше 6 лет: 3-10 капсул в один прием, доза зависит от тяжести интоксикации. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кишечная непроходимость, детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Передозировка маловероятна из-за химической и физиологической инертности препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия симетикона с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

У людей с повышенной чувствительностью к компонентам препарата, возможно возникновение реакций гиперчувствительности немедленного типа, а также реакций гиперчувствительности замедленного типа. При возникновении любых аллергических реакций прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться к врачу. В случае сохранения избыточного газообразования в течение длительного времени необходимо обратиться к врачу для проведения медицинского обследования.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.