Инструкция по применению
Симетикон Эвалар Капсулы 40 мг 25 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Симетикон
Количество в упаковке: 25



Описание

Круглые или почти круглые мягкие желтые капсулы из желатина со швом и гладкой поверхностью. Содержимое капсулы: бесцветная, вязкая, полупрозрачная жидкость.

Действующее вещество

Симетикон

Состав

Состав на одну капсулу Действующее вещество: симетикон - 40 мг. Состав оболочки желатиновой капсулы: желатин - 30,4669 мг, глицерол (глицерин) - 11,11 мг, метилпарагидроксибензоат - 0,29 мг, краситель хинолиновый желтый - 0,13 мг, краситель солнечный закат желтый - 0,0031 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Симетикон химически инертен, после приема внутрь не абсорбируется из ЖКТ и действует только в его просвете. Не взаимодействует с микроорганизмами и ферментами и не влияет на процессы пищеварения. Выводится кишечником в неизмененном виде.

Показания

Избыточное образование и скопление газов в ЖКТ (метеоризм, синдром Ремхельда, аэрофагия, повышенное газообразование в послеоперационном периоде). Подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (ультразвуковые, рентгенологические исследования и др.). Симптомы избыточного газообразования, вызванного функциональной диспепсией. Острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (в качестве пеногасителя).

Способ применения и дозы

При жалобах, связанных с избыточным газообразованием: Взрослым и детям старше 6 лет по 2 капсулы 3-5 раз в сутки, можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и при необходимости перед сном. Продолжительность курса лечения зависит от наличия симптомов повышенного газообразования. При необходимости препарат можно применять в течение длительного периода времени. Подготовка к диагностическим исследованиям: по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования и утром в день исследования 2 капсулы, не запивая водой. В качестве пеногасителя при отравлениях моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества: разовая доза для взрослых составляет 10-20 капсул, для детей старше 6 лет: 3-10 капсул в один прием, с большим количеством жидкости, дозирование зависит от тяжести интоксикации. Если после лечения улучшение не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кишечная непроходимость, детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Побочных эффектов при приеме препарата не наблюдалось. Возможно развитие аллергических реакций на компоненты препарата. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Передозировка препарата маловероятна из-за химической и физиологической инертности препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия симетикона с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

У людей с повышенной чувствительностью к компонентам препарата (метилпарагидроксибензоат и краситель хинолиновый желтый) возможно возникновение реакций гиперчувствительности немедленного типа, а также реакций гиперчувствительности замедленного типа. При возникновении любых аллергических реакций прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться к врачу. В случае сохранения избыточного газообразования в течение длительного времени необходимо обратиться к врачу для проведения медицинского обследования. Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и т.д.).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке). Хранить в недоступном для детей месте.