**Инструкция по применению**
**Симетикон с фенхелем Капсулы 25 шт**

## Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 25




## Описание

Капсулы Симетикон с фенхелем от газов в кишечнике. Плоды фенхеля обладают спазмолитическим, противорвотным действиями, усиливают секрецию желудка, кишечника, возбуждают аппетит, улучшают пищеварение, освобождают желудок и кишечник от газов, уменьшают и прекращают желудочно-кишечные колики. Симетикон снижает поверхностное натяжение на границе раздела фаз, вследствие чего затрудняет образование и способствует разрушению газовых пузырьков в содержимом кишечника и слизи желудочно-кишечного тракта. Высвобождающиеся при этом газы всасываются стенкой кишечника или удаляются благодаря перистальтике, что предупреждает образование больших газово-слизистых конгломератов, вызывающих болезненное вздутие живота. Симетикон удаляет пену физическим путем, не вступая в химические реакции. Вещество не всасывается из желудочно-кишечного тракта и не влияет на процесс пищеварения. Вследствие физической и химической инертности он не влияет на микроорганизмы и ферменты, присутствующие в желудочно-кишечном тракте, не уменьшает всасывание пищи, не изменяет реакцию и объем желудочного сока. После прохождения желудочно-кишечного тракта выводится в неизмененном виде, что уменьшает вероятность развития побочных эффектов.

**Состав**

Активное вещество: симетикон, эфирное масло фенхеля. 1 капсула содержит: Симетикон 80 мг Эфирное масло фенхеля, не менее 8 5 мг компоненты капсулы (пищевые добавки): желатин, глицерин растительного происхождения, сорбитовый сироп (подсластитель), твин 80 (эмульгатор), масло растительного происхождения, симетикон, эфирное масло фенхеля.

**Форма выпуска**

Капсулы

**Способ применения и дозы**

При повышенном газообразовании принимать взрослым по 1 капсуле 3-5 раз в день, до исчезновения газообразования.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.