Инструкция по применению
Симпатил Таблетки 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Innothera Chouzy
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 20 мг+75 мг+75 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт

Состав

1 таб. сухой экстракт эшшольции 20 мг сухой экстракт боярышника 75 мг магния оксид 124.35 мг, что соответствует содержанию элементарного магния 75 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 122 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 15 мг, стеариновая кислота микронизированная - 3.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Магния оксид в желудке превращается в магния хлорид, который абсорбируется в тонком кишечнике с помощью механизма пассивного всасывания, уровень всасывания не превышает 50%. Экскреция магния, в основном, осуществляется с мочой. Действие компонентов затруднено для кинетических наблюдений.

Показания

— состояния эмоционального напряжения и стресса, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, беспокойством, повышенной раздражительностью, тревогой, страхом, повышенной утомляемостью, сердцебиением — нарушения сна (легкой формы).

Способ применения и дозы

Назначают по 2 таб. 2 раза/сут. Таблетки принимают внутрь утром и вечером, до еды, запивая водой. Продолжительность лечения 3-4 недели. Интервал между курсами лечения 3 недели.

Противопоказания

— тяжелая почечная недостаточность (КК ниже 30 мл/мин) — возраст до 18 лет — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять препарат Симпатил при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диарея, боли в эпигастральной области.

Передозировка

Прием препарата в больших дозах может привести к задержке мочи. Лечение: регидратация, форсированный диурез. В случае почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется сочетать препарат Симпатил с лекарственными средствами, содержащими хинидин, т.к. снижается почечная экскреция хинидина в связи с ощелачиванием мочи и возможно развитие передозировки (в связи с повышением концентрации хинидина в плазме крови).

Особые указания

Пациент должен быть предупрежден о необходимости сообщить лечащему врачу об усугублении любых из указанных в инструкции побочных эффектов или о появлении других побочных эффектов, не указанных в инструкции. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период лечения следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В сухом месте