Инструкция по применению
Синокром Заменитель синовиальной жидкости Раствор для внутрисуставного введения 1 % шприц 2 мл 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Croma Pharma
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гиалуронат натрия
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10 мг/мл

Действующее вещество

Гиалуронат натрия

Состав

Активное вещество: нафазолина нитрат. ;Вспомогательные вещества: этилендиамин; борная кислота; метилпарагидроксибензоат; вода ;

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Синокром содержит гиалуронат натрия (сильное и быстродействующее вещество). ;Он является по своим свойствам вязкоэластичным полисахаридом, который применяется в качестве импланта, чтобы ввести в пораженный сустав (а именно в синовиальное пространство) ;

Показания

При дегенеративно-дистрофических и посттравматических поражениях суставов (артрозах, то есть заболеваниях невоспалительного характера), в случае ограничения подвижности в суставах и сопутствующем болевом синдроме ;

Способ применения и дозы

Инъекции проводятся врачами-специалистами в асептических условиях. Готовый шприц извлекается из стерильного футляра, каучуковый колпачок снимается с адаптера системы Люэра небольшим поворотом, после чего надевается соответствующая стерильная игла, которая фиксируется также небольшим поворотом (игла для инъекции в комплект поставки не входит). Место введения обрабатывается дезинфицирующим веществом, содержащим алкоголь. Синокром вводится точно в полость сустава по стандартным методикам, учитывая анатомические особенности. ; Введение в полость сустава должно быть прекращено при появлении боли во время инъекции. Неиспользованное средство не подлежит хранению. Курс лечения составляет 3–5 инъекций с интервалом в 1 нед. между введениями. Возможно одновременное лечение нескольких суставов. Курс лечения из 5 инъекций может быть эффективным более 6 мес. (в зависимости от степени тяжести заболевания). Допускаются повторные курсы лечения ;

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов. ;Ввиду внутрисуставного введения пациентам с бактериальным артритом следует воздержаться от лечения во избежание возможных осложнений. Лечащий врач должен быть осведомлен обо всех иммунологических и других возможных последствиях применения биологических средств. ;

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение у беременных и кормящих женщин не исследовалось ;

Побочные действия

В крайне редких случаях возможно проявление местных симптомов (боль, чувство жара, покраснение и отечность, увеличение содержания экссудата в полости сустава). ; Во избежание таких проявлений или при их появлении рекомендуется разгрузить пораженный сустав и в течение 5–10 мин прикладывать к суставу пузырь со льдом. В случае выраженных проявлений, сопровождающихся сильной болью, раствор должен быть удален из пострадавшего сустава. ;Отмечены единичные случаи аллергических (зуд, сыпь, крапивница) и анафилактических реакций ;

Передозировка

При передозировке препаратом Синокром возможны ощущение жара; болевые ощущения; появление красноты; отекание области введения. Для того чтобы избежать всего этого, сразу после введения необходимо приложить что-либо холодное (например, лед) на 15 минут ;

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время нет информации о несовместимости с другими растворами для внутрисуставного введения. ;Не следует применять дезинфицирующие средства, содержащие соли четвертичного аммония, поскольку гиалуроновая кислота осаждается в присутствии этих веществ ;

Особые указания

Предназначен только для внутрисуставного введения. ;Применение не исследовалось у беременных женщин и детей младше 18 лет. ;Только для одноразового использования. Повторная стерилизация не допускается. ;Не использовать шприц из открытой и/или поврежденной стерильной упаковки. ;Не использовать шприц с открытым или поврежденным колпачком стерильного шприца ;