Инструкция по применению
Синтомицин Линимент 10% 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Линимент
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10%

Описание

Линимент белого или белого с желтоватым оттенком цвета, со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Хлорамфеникол

Состав

На 100 г линимента: Действующее вещество: Хлорамфеникол \[D, L\] (синтомицин) 10,00 г Вспомогательные вещества: Кислота сорбиновая 0,20 г Масло касторовое 20,25 г Эмульгатор №1 8,00 г Кармеллоза натрия 1,00 г Вода очищенная 60,55 г,

Форма выпуска

Линимент

Фармакокинетика

При наружном применении всасываемость незначительна.

Показания

Инфицированные раны во II фазе раневого процесса (отсутствие гноя, некротических тканей), вызванные чувствительными микроорганизмами, в том числе ожоги 2-3 степени, длительно незаживающие трофические язвы.

Способ применения и дозы

Наружно. После хирургической обработки ран и ожогов препарат Синтомицин наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку (или на перевязочный материал, а затем - на рану). Тампонами с линиментом рыхло наполняют полости гнойных ран после их хирургической обработки, а марлевые турунды с препаратом Синтомицин вводят в свищевые ходы. При лечении ран и ожогов во II фазе раневого процесса - 1 раз в 1-3 суток в зависимости от динамики заживления ран. Длительность лечения определяется динамикой очищения и заживления очагов поражения. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям и тому способу применения, которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хлорамфениколу и другим компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, период новорожденное (до 4 недель), угнетение костномозгового кроветворения, острая интермиттирующая порфирия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, печеночная недостаточность, почечная недостаточность, заболевания кожи (грибковые заболевания, псориаз, экзема). Ввиду отсутствия осмотической активности (основа - масло, эмульгатор) не рекомендуется применять в первой фазе раневого процесса (обильное гноетечение, выраженный отек тканей, боль и наличие некротических тканей). Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан.

Побочные действия

Зуд, покраснение кожи или сухость обрабатываемого участка кожи, кожно-аллергические реакции, ангионевротический отек. Со стороны органов кроветворения: ретикулоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритропения, апластическая анемия, агранулоцитоз. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Синтомицин до настоящего времени не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови. При нанесении на обширные поверхности с одновременным приемом этанола возможно развитие дисульфирам-подобных реакций (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат Синтомицин не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.