Инструкция по применению
Синтомицин Линимент 10% 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Линимент
Страна: Россия
Производитель: Зеленая Дубрава
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородный линимент белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Хлорамфеникол

Состав

Действующее вещество: хлорамфеникол \[D,L\] - 10,0 г, вспомогательные вещества: клещевины обыкновенной семян масло - 20,0 г, эмульгатор №1 - 5,0 г, сорбиновая кислота - 0,2 г, кармеллоза натрия - 1,98 г, вода очищенная - до 100,0 г.

Форма выпуска

Линимент

Фармакокинетика

Степень системного действия после применения на кожу неизвестна.

Показания

Инфицированные раны во II фазе раневого процесса (отсутствие гноя, некротических тканей), вызванные чувствительными микроорганизмами: ожоги 2-3 степени, длительно незаживающие трофические язвы.

Способ применения и дозы

Наружно. После хирургической обработки ран и ожогов линимент наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или линимент наносят на перевязочный материал, а затем - на рану. Тампонами с линиментом рыхло наполняют полости гнойных ран после их хирургической обработки, а марлевые турунды с препаратом вводят в свищевые ходы. Кратность нанесения - 1 раз в 1 - 3 дня в зависимости от динамики заживления. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хлорамфениколу и другим вспомогательным веществам, период новорожденности (до 4 недель), угнетение костномозгового кроветворения, острая интермиттирующая порфирия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, печеночная и/или почечная недостаточность, заболевания кожи (грибковые поражения, псориаз, экзема), I фаза раневого процесса (ввиду отсутствия осмотической активности).

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных относительно нежелательного воздействия на плод и новорожденного при использовании препарата во время беременности или грудного вскармливания не выявлено. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции - кожная сыпь, ангионевротический отек. Со стороны органов кроветворения: ретикулоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритропения, апластическая анемия, агранулоцитоз. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином возможно взаимное ослабление действия за счет того, что хлорамфеникол \[D,L\] может вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с субъединицей 50S бактериальных рибосом. Снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов.

Особые указания

В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови. При нанесении на обширные поверхности с одновременным приемом этанола возможно развитие дисульфирамоподобных реакций (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Не выявлено.

Условия хранения

При температуре не выше 15 °C. Хранить в недоступном для детей месте.