Инструкция по применению
Синупрет Таблетки покрытые оболочкой 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Корень горечавки+Корень первоцвета+Корень щавеля+Корень бузины+Корень вербены
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 36

Действующее вещество

Корень горечавки+Корень первоцвета+Корень щавеля+Корень бузины+Корень вербены

Состав

На 1 таблетку: **Активные компоненты:** * горечавки корни (Gentiana lutea) 6,0 мг * первоцвета цветки (Primula veris) 18,0 мг * щавеля трава (Rumex acetosa) 18,0 мг * бузины цветки (Sambucus nigra) 18,0 мг * вербены трава (Verbena officinalis) 18,0 мг **Вспомогательные компоненты:** крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный, вода очищенная, лактозы моногидрат, желатин, сорбитол, стеариновая кислота,оболочка:кальция карбонат, глюкозы сироп, лак зеленый Е 104, Е 132, лак желто-зеленый Е 104, Е 132, магния оксид, крахмал кукурузный, декстрин, воск горный гликолевый, натрия карбонат безводный; метилметакрилата, диметиламиноэтилметакрилата и бутилметакрилата сополимер, повидон К 25, касторовое масло, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Синупрет не предоставлены.

Показания

Острые и хронические синуситы, сопровождающиеся образованием вязкого секрета.

Способ применения и дозы

Внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. **Взрослым:** по 2 таблетки 3 раза в день. **Детям школьного возраста:** по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения составляет 7-14 дней. Если симптомы сохраняются более 7-14 дней или повторяются периодически, то необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость лактозы, фруктозы, галактозы (из-за содержания в препарате лактозы моногидрата, глюкозы сиропа и сахарозы), детский возраст до 6 лет (из-за недостаточности клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Синупрета в период беременности возможно только по назначению врача.Препарат не рекомендуется принимать в период кормления грудью (в связи с отсутствием опыта его клинического применения).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, покраснение кожи, зуд, ангионевротический отек, одышка), желудочно-кишечные расстройства (боль в эпигастральной области, тошнота). При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

В случае передозировки возможно усиление выраженности дозозависимых побочных эффектов. Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна.Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени не известно.

Особые указания

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).Указание для пациентов с сахарным диабетомУсваиваемые углеводы, содержащиеся в одной таблетке, составляют около 0,01 «хлебных единиц» (ХЕ).

Условия хранения

В сухом месте