Инструкция по применению
Синупрет Капли 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Корень горечавки+Корень первоцвета+Корень щавеля+Корень бузины+Корень вербены
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Описание

.

Действующее вещество

Корень горечавки+Корень первоцвета+Корень щавеля+Корень бузины+Корень вербены

Состав

Действующее вещество: entianae radix (корня горечавки) 0, 2 г, Primulae flos (цветков первоцвета) 0, 6 г, Rumicis herba (травы щавеля) 0, 6 г, Sambuci flos (цветков бузины) 0, 6 г, Концентрация действующего вещества: entianae radix (корня горечавки) 0, 2 г, Primulae flos (цветков первоцвета) 0, 6 г, Rumicis herba (травы щавеля) 0, 6 г, Sambuci flos (цветков бузины) 0, 6 г, Verbenae herba (травы вербены) 0, 6 г. Содержание этанола: 16, 0–19, 0 % (в объемном отношении)

Форма выпуска

Капли

Показания

Острые и хронические синуситы.

Способ применения и дозы

Взрослым: по 50 капель или по 2 драже 3 раза в день. Детям школьного возраста: по 25 капель или по 1 драже 3 раза в день.Детям от 2 до 6 лет: по 15 капель 3 раза в день.Курс лечения составляет 7-14 дней.Драже проглатываются целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Если симптомы сохраняются более 7-14 дней или повторяются периодически, то необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Драже: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, непереносимость лактозы, детский возраст (до 6 лет).Капли: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, алкоголизм, детский возраст (до 2 лет). Не следует принимать препарат пациентам после успешного антиалкогольного лечения.С осторожностью: заболевания печени, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применение возможно только по назначению врача. Принимать капли Синупрет (содержит алкоголь) следует только при невозможности использования драже .Препарат не рекомендуется принимать в период кормления грудью в связи с отсутствием опыта его клинического применения в этом случае.

Побочные действия

В очень редких случаях возможно появление боли в верхней части живота, в отдельных случаях - аллергических реакций (кожная сыпь, одышка).

Передозировка

Симптомы: возможно усиление выраженности дозозависимых побочных эффектов. Лечение: проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с антибактериальными ЛС возможна и целесообразна.Взаимодействие с другими ЛС до настоящего времени неизвестно.

Особые указания

В составе препарата содержится 16–19% этанола (в объемном отношении).При использовании флакон следует держать в вертикальном положении.В процессе хранения капель Синупрет возможно легкое помутнение жидкости или выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПри применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами, требующими повышенного внимания.

Условия хранения

В сухом месте