Инструкция по применению
Синусовит Таблетки 50 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Таблетки круглые двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, от светло-зеленого до зеленого цвета.

Состав

Состав на одну таблетку Активные компоненты Горечавки желтой корни*, порошок 6,0 мг Первоцвета цветки*, порошок 18,0 мг Щавеля кислого трава*, порошок 18,0 мг Бузины черной цветки*, порошок 18,0 мг Вербены лекарственной трава*, порошок 18,0 мг Вспомогательные вещества ядра Лактозы моногидрат 31,2 мг Крахмал картофельный 8,4 мг Кальция стеарат 1,2 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил) 1,2 мг Масса ядра 120,0 мг Вспомогательные вещества оболочки Сахароза 115,260 мг Магния карбонат (магния карбонат основной) 15,474 мг Титана диоксид 3,404 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил) 1,857 мг Повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, повидон К-30) 1,857 мг Тальк 1,857 мг Краситель АКВАНАТ Хлорофилл 0,186 мг Парафин жидкий (масло вазелиновое) 0,075 мг Воск пчелиный 0,030 мг Масса оболочки 140,0 мг Масса таблетки, покрытой оболочкой 260,0 мг *- Латинские названия лекарственных растений, используемых для получения активных компонентов: горечавка желтая- Gentiana lutea L., сем. горечавковые- Gentianaceae, первоцвет весенний или первоцвет высокий- Primula veris L. или P. elator (L.) Hill, сем. первоцветные- Primulaceae, щавель кислый- Rumex acetosa L., сем. гречишные- Polygonaceae, бузина черная- Sambucus nigra L., сем. бузиновые- Sambucaceae (жимолостные- Caprifoliaceae), вербена лекарственная- Verbena officinalis L., сем. вербеновые- Verbenaceae.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Острые и хронические синуситы, сопровождающиеся образованием вязкого секрета.

Способ применения и дозы

Внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Взрослым: по 2 таблетки 3 раза в день. Детям школьного возраста: по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения составляет 7-14 дней. Если симптомы сохраняются более 7-14 дней или повторяются периодически, то необходимо проконсультироваться с врачом. Если после лечения улучшение не наступает, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость лактозы, фруктозы, галактозы (из-за содержания в препарате лактозы моногидрата и сахарозы), детский возраст до 6 лет (из-за недостаточности клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение в период беременности возможно только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Не рекомендуется применять в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, покраснение кожи, зуд, ангионевротический отек, одышка), желудочно-кишечные расстройства (боль в эпигастральной области, тошнота). Если любые из указанных в инструкции побочных действий усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В случае передозировки возможно усиление выраженности дозозависимых побочных эффектов. Лечение- симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна. Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени не известно.

Особые указания

Препарат содержит лактозы моногидрат и сахарозу. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,14 г углеводов (0,012 ХЕ).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке) при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.