Инструкция по применению
Систейн капли глазные 3мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Испания
Производитель: Alcon Laboratories
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Состав

Полиэтиленгликоля – 0,4%; Пропиленгликоля – 0,3%; Хлорида натрия – 0,1%; Борной кислоты – 0,7%; Гидроксипропилгуара – 0,16-0,19%; Хлорида калия – 0,12%; 2-амино-2-метилпропанола – 0,57%; Сорбитола – 1,4%; Поликвад – 0,001%; Воду очищенную и натрия гидроксид или кислоту хлористоводородную (для стабилизации pH).

Форма выпуска

Капли

Показания

Капли Систейн Ультра рекомендуют пациентам, которые страдают сухостью глаз, обусловленной сухим и загрязненным воздухом, дымом, косметикой, ношением контактных линз и прочими внешними факторами.

Способ применения и дозы

Средство Систейн Ультра используют для закапывания в глаза. Перед каждым использованием флакон с каплями следует встряхивать. Средство Систейн Ультра допускается применять в любое время суток для увлажнения глаз. В каждый глаз рекомендуется вносить 1-2 капли, после чего для равномерного распределения средства следует 3-4 раза медленно моргнуть. Вносить капли следует только чистыми руками. Для инстилляции капель следует аккуратно оттянуть веко, а второй рукой, удерживая флакон вверх дном, нажать на аппликатор. Систейн Ультра разрешается применять до и после использования контактных линз. При использовании средства следует избегать прикосновения наконечника флакона к коже и слизистым оболочкам.

Противопоказания

Систейн Ультра запрещено применять лицам с непереносимостью средства или отдельных его компонентов. Средство Систейн Ультра не рекомендуется для использования в педиатрической практике.

Применение при беременности и кормлении грудью

Систейн Ультра не проходил клинических исследований у кормящих и беременных женщин. Применение средства во время вынашивания ребенка возможно только по рекомендации специалиста. В период лактации средство Систейн Ультра следует применять только после консультации со специалистом.

Побочные действия

Развитие нежелательных эффектов не отмечалось. В некоторых случаях существует риск развития раздражения, слезотечения и гиперемии глаз. При развитии побочных действий необходимо обратиться к специалисту.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия, имеющие клиническое значение, не отмечались. При необходимости одновременной терапии несколькими офтальмологическими местными препаратами следует соблюдать временные интервалы между их использованием и придерживаться рекомендованной врачом последовательности.

Условия хранения

В сухом месте