Инструкция по применению
Систейн Капли глазные 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Испания
Производитель: Alcon Laboratories
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Состав

Полиэтиленгликоль 0,4%. Пропиленгликоль 0,3%. Гидроксипропил-гуар 0,16%-0,19%. Кислота борная 0,7%. Калия хлорид 0,12%. Натрия хлорид 0,1%. Сорбитол 1,4%. 2-амино-2-метилпропанол 0,57%. Хлорид полидрония 0,001%. Кислота хлористоводородная и/или натрия гидроксид (для доведения pH). Вода очищенная (до объема 100%).

Форма выпуска

Капли

Показания

Облегчает симптомы синдрома "сухого глаза" (такие как чувство жжения и раздражения). Может быть использовано для смазывания и увлажнения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз дневного и пролонгированного режимов ношения.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением флакон встряхивать. Применяться по мере необходимости на протяжении дня для увлажнения и увеличения комфорта глаз. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте. При ношении контактных линз в случае незначительного раздражения, дискомфорта или помутнения, закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте 2-3 раза. Может быть использовано до и во время ношения контактных линз, а также после их снятия.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Особые указания

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора. Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены. Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Не используйте раствор более 6 месяцев после первого вскрытия флакона.

Условия хранения

В сухом месте