Инструкция по применению
Скин-кап Аэрозоль 0,2 % 35 г

Характеристики

Форма выпуска: Аэрозоль
Страна: Испания
Производитель: ИНВАР
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиритион цинк
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 200 мг/мл



Действующее вещество

Пиритион цинк

Состав

Цинк пиритион активированный 0.2 г.Вспомогательные вещества: изопропилмиристат - 48.37 г, полисорбат 80 - 0.32 г, троламин - 0.04 г, этанол - 34 г, вода - 0.5 г; пропелленты до 100 г: изобутан - 76.2%, пропан - 23.29%, бутан - 0.51%.

Форма выпуска

Аэрозоль

Фармакокинетика

При наружном применении цинк пиритион депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная абсорбция происходит медленно. Обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания

Аэрозоль для наружного применения (для взрослых и детей старше 1 года):— псориаз— атопический дерматит— экзема— нейродермит— себорейный дерматит. Крем для наружного применения (для взрослых и детей старше 1 года):— псориаз— атопический дерматит (экзема, нейродермит)— себорейный дерматит— сухость кожи. Шампунь:— псориаз— атопический дерматит волосистой части головы— себорейный дерматит— зуд— перхоть— жирная себорея— сухая себорея.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. Перед применением шампуня интенсивно встряхнуть флакон. Нанести небольшое количество шампуня Скин-кап на влажные волосы и помассировать кожу головы. Промыть и нанести шампунь повторно. Оставить шампунь на волосах в течение 5 мин, затем тщательно промыть большим количеством воды. Препарат применяют 2-3 раза в неделю в течение первых 2 недель. Курс лечения при псориазе составляет 5 недель, при себорее - 2 недели. В период ремиссии шампунь можно использовать 1-2 раза в неделю в качестве средства профилактики рецидивов. Крем для наружного применения после интенсивного встряхивания наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза/сут. Курс лечения при псориазе составляет 1-1.5 мес, при атопическом дерматите - 3-4 недели. Аэрозоль для наружного применения распыляют в достаточном количестве на пораженные участки кожи с расстояния около 15 см. Применяют 2-3 раза/сут до достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого эффекта применение препарата рекомендуется продолжить в течение одной недели после исчезновения симптомов. Перед применением баллон сильно встряхнуть несколько раз. Во время распыления баллон следует держать вертикально. Для обработки аэрозолем волосистой части головы прилагается специальная насадка.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.