Инструкция по применению
Скин-кап Аэрозоль для наружного применения 0,2 % 70 г

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Испания
Производитель: ИНВАР
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиритион цинк
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 70 г
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Пиритион цинк

Состав

Действующее вещество: Пиритион Цинк (Pyrithione Zinc)Концентрация действующего вещества (мг): 2

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При наружном применении цинк пиритион депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная абсорбция происходит медленно. Обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания

Псориаз; атопический дерматит (экзема, нейродермит); себорейный дерматит.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно.Аэрозоль для наружного применения распыляют в достаточном количестве на пораженные участки кожи с расстояния около 15 см. Применяют 2-3 раза/сут до достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого эффекта применение препарата рекомендуется продолжить в течение одной недели после исчезновения симптомов. Перед применением баллон сильно встряхнуть несколько раз. Во время распыления баллон следует держать вертикально. Для обработки аэрозолем волосистой части головы прилагается специальная насадка.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Исследования по безопасности применения препарата Скин-кап при беременности и в период лактации не проводились.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Скин-кап не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое взаимодействие препарата Скин-кап с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Скин-кап не влияет на естественный цвет и состояние волос.

Условия хранения

Беречь от детей