Инструкция по применению
Скин-Кап Крем для наружного применения 0,2 % 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Испания
Производитель: ИНВАР
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиритион цинка
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Пиритион цинка

Состав

Действующее вещество: Пиритион Цинк (Pyrithione Zinc)Концентрация действующего вещества (%): 0,2%

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При наружном применении цинк пиритион депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная абсорбция происходит медленно. Обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания

Псориаз; атопический дерматит (экзема, нейродермит); себорейный дерматит, сухость кожи.

Способ применения и дозы

Крем для наружного применения после интенсивного встряхивания наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза/сут. Курс лечения при псориазе составляет 1-1.5 мес, при атопическом дерматите - 3-4 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Исследования по безопасности применения препарата Скин-кап при беременности и в период лактации не проводились.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Скин-кап не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое взаимодействие препарата Скин-кап с другими лекарственными средствами не выявлено.

Условия хранения

Беречь от детей