Инструкция по применению
Скипидар Терпентинное Масло для наружного применения 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Ярославская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая, подвижная жидкость с характерным запахом.

Состав

Активный компонент: Терпентинное масло эфирное очищенное (скипидар живичный) - 50 мл, 100 мл.

Форма выпуска

Масло

Показания

В составе комплексной терапии невралгии, миалгии, люмбоишиалгии, артралгии, ревматических болей.

Способ применения и дозы

Наружно, взрослым 1-3 раза в сутки. Наносят на болезненные участки кожи, растирают легкими круговыми движениями и накладывают согревающую повязку. Проводят 10-15 процедур. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компоненту препарата, нарушение целостности или воспалительные заболевания кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата, детский возраст до 18 лет (так как эффективность и безопасность препарата у детей не изучалась), беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Гиперемия и зуд кожи. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки при местном и наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Терпентинное масло следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания в рот, в глаза и на слизистые оболочки. При попадании масла в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения препарата допускается наложение бинтовой повязки, однако не следует накладывать воздухонепроницаемых окклюзионных повязок. В случае развития после нанесения препарата кожной сыпи его использование необходимо прекратить.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциальных опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т. п.).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.