Инструкция по применению
Слабикап Таблетки 5 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алиум
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натрия пикосульфат
Количество в упаковке: 20



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской и риской.

Действующее вещество

Натрия пикосульфат

Состав

Каждая таблетка препарата СЛАБИКАП содержит натрия пикосульфата моногидрат 5,187 мг, в пересчете на натрия пикосульфат 5 мг. Прочими вспомогательными веществами являются лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный (аэросил), магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат СЛАБИКАП применяют в качестве слабительного средства у взрослых и детей в возрасте от 4 лет в следующих случаях: запор, обусловленный атонией и гипотонией толстой кишки (в том числе в пожилом возрасте, у лежачих больных, после операций, после родов, в период грудного вскармливания), запор, вызванный приемом лекарственных средств, для регулирования стула при геморрое, проктите, анальных трещинах (для размягчения консистенции кала), заболевания желчного пузыря, синдром раздраженного кишечника с преобладанием запоров, запор, обусловленный дисбактериозом кишечника, нарушением диеты.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза: Взрослые По 1-2 таблетки (5-10 мг) в сутки. Максимальная суточная доза - 10 мг (2 таблетки по 5 мг). Лечение начинают с наименьшей дозы, затем дозу можно повышать для обеспечения регулярного стула. Дозу подбирают, исходя из индивидуальных потребностей. Дети Рекомендуемая доза для детей в возрасте от 4 до 10 лет составляет от половины до 1 таблетки (2,5-5 мг) в сутки. Рекомендуемая доза для детей в возрасте старше 10 лет составляет 1-2 таблетки (5-10 мг) в сутки. Не превышайте максимальную рекомендуемую суточную дозу! Способ применения Препарат необходимо принимать внутрь, запивая достаточным количеством жидкости (не менее полстакана воды). Препарат можно применять разово по мере необходимости или в течение 10 дней. Если Вы хотите добиться слабительного эффекта в утренние часы, примите препарат перед сном. Для восстановления естественного ритма дефекации наряду с приемом слабительного препарата рекомендуется повышение физической активности, достаточное потребление пищевых волокон в рационе (20-25 г в сутки), достаточное потребление жидкости (не менее 2 л). Действие наступает через 10-12 часов после приема. Если Вы забыли принять препарат СЛАБИКАП Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если Вы забыли принять препарат в нужное время, следуйте своему обычному графику дозирования, приняв следующую дозу в назначенное время. Как долго принимать препарат СЛАБИКАП Не применяйте препарат СЛАБИКАП более 10 дней без консультации с врачом. Во многих случаях нет необходимости в ежедневном приеме полной дозы, доза может быть уменьшена в зависимости от индивидуальных потребностей или препарат может применяться разово по мере необходимости. Длительный прием высоких доз препарата может приводить к потере жидкости, нарушению баланса электролитов, пониженной концентрации калия в крови (гипокалиемии). При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лежащему -врачу или работнику аптеки.

Противопоказания

Не принимайте препарат СЛАБИКАП: если у Вас аллергия на натрия пикосульфат или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша, если у Вас кишечная непроходимость или обструктивные заболевания кишечника, когда отмечается нарушение прохождения пищи по кишечнику, вызванное закупоркой его просвета, сдавлением, спазмом, расстройствами кровоснабжения или проведения нервных импульсов, если у Вас острые заболевания органов брюшной полости или сильная боль в животе, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой, повышением температуры тела, включая аппендицит, если у Вас острые воспалительные заболевания кишечника, например энтерит, дуоденит и колит, в том числе вызванные бактериями, вирусами или простейшими, если у Вас тяжелое обезвоживание, если у Вас нарушено переваривание и всасывание некоторых сахаров (дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция), не давайте препарат детям в возрасте менее 4 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Не принимайте препарат СЛАБИКАП во время беременности, если препарат не назначил Вам лечащий врач, осведомленный о том, что Вы беременны. Натрия пикосульфат и его метаболиты не выделяются с грудным молоком, поэтому препарат СЛАБИКАП можно принимать в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат СЛАБИКАП может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Сообщите лечащему врачу, если заметите любую из следующих нежелательных реакций. Нежелательные реакции, частота возникновения которых неизвестна: дискомфорт со стороны желудка и кишечника, тошнота, рвота, спазмы и боли в области живота, диарея, головокружение и обморок, которые могут быть вызваны напряжением при опорожнении кишечника или спазмами в области живота, аллергические реакции, кожные реакции, например ангионевротический отек, лекарственная сыпь, кожная сыпь, кожный зуд.

Передозировка

Если Вы приняли препарата СЛАБИКАП больше, чем следовало Если Вы применили больше препарата, чем следовало, немедленно сообщите об этом лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Любые другие препараты нужно принимать за 2 часа до приема препарата или через 6 ч после. Мочегонные (диуретики) или глюкокортикостероиды увеличивают риск нарушения электролитного баланса (гипокалиемии) при приеме высоких доз препарата. Нарушение электролитного баланса может повышать чувствительность к препаратам для лечения сердечной недостаточности (сердечным гликозидам). Нарушения электролитного баланса, которые могут возникать после приема слабительных средств, также влияют на эффективность и безопасность препаратов лития, антидепрессантов, антипсихотиков и карбамазепина. Совместное применение препарата и антибиотиков может снижать послабляющий эффект препарата.

Особые указания

Перед приемом препарата СЛАБИКАП проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. При использовании слабительных средств необходимо поддерживать водноэлектролитный баланс, чтобы не допустить чрезмерного обезвоживания. Особой консультации требуют случаи, когда препарат применяют перед операциями на органах желудочно-кишечного тракта или если подобные операции были выполнены в недавнее время. Дети Препарат СЛАБИКАП, таблетки, не применяют у детей в возрасте до 4 лет. У детей в возрасте старше 4 лет препарат применяют строго по назначению врача. Препарат СЛАБИКАП содержит лактозу Препарат содержит лактозу (молочный сахар). Если у Вас есть непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат может вызывать спазм кишечника, из-за которого может возникнуть головокружение или обморок (см. раздел 4). Если у Вас возникает спазм кишечника, избегайте потенциально опасных видов деятельности, в том числе вождения или работы механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °C.