Инструкция по применению
Слабилен Капли 7,5 мг/мл 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: ЛЭНС-ФАРМ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натрия пикосульфат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.75%
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Натрия пикосульфат

Состав

Действующее вещество: Натрия пикосульфат Концентрация действующего вещества (мг): 7,5 мг

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

После приема внутрь не абсорбируется из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.

Показания

Запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки; Регулирование стула при геморрое, проктите, трещинах ануса; Подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Способ применения и дозы

Внутрь с небольшим количеством воды, перед сном. Взрослые начальная доза 10-20 капель, при стойких запорах - до 30 капель. Для детей старше 4 лет начальная доза -5-8 капель. В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают.

Противопоказания

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит абдоминальные боли (неясного генеза), кровотечения из желудочно-кишечного тракта, метроррагия, цистит, выраженная дегидратация, спастический запор, детский возраст (до 4 лет), беременность (I триместр). С осторожностью - период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан в I триместре беременности. Применять в II и III триместре беременности следует только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. При необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Диарея, абдоминальные боли, обезвоживание, нарушения водно-электролитного баланса, слабость, судороги, снижение артериального давления.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с антибиотиками широкого спектра действия возможно уменьшение слабительного действия натрия пикосульфата. При одновременном применении с диуретиками, с ГКС возможно повышение риска электролитных нарушений. Электролитный дисбаланс, возникающий на фоне приема натрия пикосульфата в высоких дозах, может привести к ухудшению переносимости сердечных гликозидов при их одновременном применении.

Особые указания

Не обладает вкусовыми качествами, поэтому детям можно добавлять в пищу.

Условия хранения

В сухом месте