Инструкция по применению
Слабилен Таблетки покрытые оболочкой 5 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натрия пикосульфат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 5 мг



Описание

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой бледно-желтого цвета, круглые, двояковыпуклые. С двух сторон нанесена маркировка в виде вдавленной буквы "S". На поперечном разрезе ядро таблетки белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Натрия пикосульфат

Состав

1 таблетка содержит натрия пикосульфат 5 мг Вспомогательные вещества: крахмал картофельный 27.64 мг, лактозы моногидрат 58.45 мг, повидон 2.96 мг, магния стеарат 0.95 мг. Состав пленочной оболочки: Опадрай II желтый 2.85 мг, в т. ч. поливиниловый спирт 1.14 мг, тальк 0.422 мг, макрогол 0.576 мг, титана диоксид 0.695 мг, краситель железа оксид желтый 0.017 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь не всасывается из желудочно-кишечного тракта и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.

Показания

Запор обусловленный гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки. Регулирование стула при геморрое проктите трещинах ануса. Подготовка к хирургическим операциям инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Способ применения и дозы

Внутрь целиком не разламывая запивая небольшим количеством воды перед сном. Для взрослых и детей старше 10 лет начальная доза - 5 мг (1 таблетка по 5 мг) 1 раз в сутки при стойких запорах - до 10 мг (2 таблетки по 5 мг) 1 раз в сутки. В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают. Максимальная суточная доза - 15 мг (1 таблетка по 15 мг или 3 таблетки по 5 мг или 2 по 75 мг).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, дефицит лактазы непереносимость лактозы глюкозо-галактозная мальабсорбция, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, абдоминальная боль (неясного генеза), кровотечения из желудочно-кишечного тракта, метроррагия, цистит, выраженная дегидратация, спастический запор, детский возраст до 10 лет (для данной лекарственной формы детям младше 10 лет рекомендуется прием Слабилена в другой лекарственной форме - капли для приема внутрь), беременность (I триместр).

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о достоверных и хорошо контролируемых исследованиях у беременных женщин отсутствуют. Длительный опыт применения не выявил отрицательного влияния пикосульфата натрия на беременность. Применение пикосульфата натрия в I триместре беременности противопоказано. Во II и III триместрах беременности (как и при применении других слабительных средств) применение препарата возможно только по назначению врача. Активный метаболит и его глюкурониды не выделяются с грудным молоком. Таким образом препарат может быть использован в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Диарея абдоминальная боль обезвоживание нарушения водно-электролитного баланса слабость судороги снижение артериального давления.

Передозировка

Симптомы: диарея обезвоживание снижение артериального давления нарушения водно-электролитного баланса судороги. Кроме того при хронической передозировке возможно развитие ишемии слизистой оболочки толстой кишки вторичного гиперальдостеронизма мочекаменной болезни поражения почечных канальцев. Лечение: промывание желудка коррекция нарушений водно-электролитного баланса спазмолитические средства.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам. Глюкокортикостероиды диуретики увеличивают риск развития электролитных нарушений. Антимикробные препараты широкого спектра действия снижают эффективность натрия пикосульфата.

Особые указания

Не следует применять ежедневно без врачебного контроля более 10 дней. У детей следует применять только по назначению врача.

Срок хранения после открытия

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия хранения

3 года. Не применять по истечении срока годности.