Инструкция по применению
Слезин Капли глазные флакон 15 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Румыния
Производитель: К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гипромеллоза+Декстран
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 3 мг+1 мг/мл
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Гипромеллоза+Декстран

Состав

В 1 мл содержится гипромеллоза 3 мг, декстран 70 1 мгВспомогательные вещества: глицерол - 2 мг, борная кислота - 3 мг, натрия тетрабората декагидрат - 350 мкг, калия хлорид - 1.2 мг, натрия хлорид - 6.2 мг, динатрия эдетата дигидрат - 500 мкг, бензалкония хлорид - 75 мкг, натрия гидроксида 1М раствор или хлористоводородной кислоты 1М раствор - до pH 7.4±0.1, вода очищенная - до 1 мл = 1.00645 г.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Гипромеллоза имеет большой молекулярный вес (86 000 Дальтон) и поэтому всасывается медленно. Гипромеллоза является метаболически инертным материалом

Показания

Болезни слезной железы

Способ применения и дозы

Местно.Закапывают по 1-2 капле в конъюнктивальный мешок каждого пораженного глаза по мере необходимости несколько раз в сутки или согласно предписаниям врача. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и назначается врачом. При отсутствии эффекта следует прекратить закапывание препарата

Противопоказания

Детский и подростковый возраст до 18 лет (данных о возможности применения нет);— повышенная чувствительность к компонентам препарата

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Адекватных и строго контролируемых клинических исследований по безопасности и эффективности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось

Побочные действия

Нечасто (0.1-1%): затуманивание зрения, чувство дискомфорта глаз (жжение, покалывание).Редко (0.01-0.1%): покраснение глаз, слезотечение, усталость глаз. Возможно развитие аллергических реакций

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки Слезина не сообщалось. При попадании в глаза избыточного количества офтальмологического раствора следует промыть глаза теплой водой

Взаимодействие с другими препаратами

Слезин не совместим с глазными капелями, содержащими соли металлов (цинка сульфат и др.)

Особые указания

При ношении контактных линз перед закапыванием препарата их следует снять и снова установить не ранее, чем через 15 мин после применения препарата.Препарат Слезин не следует применять для инъекций.Если после 2-3 дней применения препарата нет улучшения, рекомендуется прервать лечение.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиИз-за возможного затуманивания зрения, в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении