Инструкция по применению
Слипзон Таблетки покрытые пленочной оболочкой 15 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Доксиламин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 15 мг
Срок годности: 3.0

Описание

Антагонист гистаминовых H1-рецепторов.

Действующее вещество

Доксиламин

Состав

Доксиламина сукцинат 15 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), кроскармеллоза натрия, магния стеарат. Оболочка пленочная: пленкообразующая смесь (гипромеллоза, титана диоксид (E171), макрогол 400, краситель железа оксид черный (E172), краситель железа оксид красный (E172)).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь Cmax в плазме крови достигается в среднем через 2 ч. T1/2 - около 10 ч. Абсорбция высокая, метаболизируется в печени. Хорошо проникает через гистотематические барьеры (включая ГЭБ). Выводится на 60 % почками в неизмененном виде, частично - через ЖКТ.

Показания

Внутрь. Назначают в дозе 7.5-15 мг 1 раз в сутки за 15-30 мин до сна. При необходимости, по рекомендации врача доза может быть увеличена до 30 мг. Продолжительность лечения - от 2 до 5 дней.

Способ применения и дозы

Внутрь. Назначают в дозе 7.5-15 мг 1 раз в сутки за 15-30 мин до сна. При необходимости, по рекомендации врача доза может быть увеличена до 30 мг. Продолжительность лечения - от 2 до 5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к доксиламину, закрытоугольная глаукома или семейный анамнез закрытоугольной глаукомы, заболевания уретры и предстательной железы, сопровождающиеся нарушением оттока мочи, детский возраст до 15 лет. С осторожностью: пациентам со случаями апноэ в анамнезе - в связи с тем, что доксиламин может усугублять синдром ночного апноэ (внезапная остановка дыхания во сне), пациентам старше 65 лет - в связи с возможными головокружениями и замедленными реакциями с опасностью падений (например, при ночных пробуждениях после приема снотворных), а также в связи с возможным удлинением T1/2, пациентам с почечной и печеночной недостаточностью (T1/2 может удлиняться).

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение доксиламина у беременных женщин по показаниям в рекомендуемых дозах на протяжении всего периода беременности. В случае назначения доксиламина на поздних сроках беременности следует принимать во внимание атропиноподобные и седативные свойства доксиламина при наблюдении за состоянием новорожденного. Противопоказано применение в период грудного вскармливания связи с возможностью развития седативного или возбуждающего эффекта у новорожденного.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы:запор, сухость слизистой оболочки полости рта. Со стороны сердечно-сосудистой системы:ощущение сердцебиения. Со стороны органа зрения:нарушения зрения и аккомодации, нечеткое зрение. Со стороны мочевыводящей системы:задержка мочи. Со стороны нервной системы:сонливость в дневное время, спутанность сознания, галлюцинации. Со стороны лабораторных показателей:увеличение уровня креатинфосфокиназы. Со стороны костно-мышечной системы:рабдомиолиз.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме доксиламина с антидепрессантами (амитриптилин, доксепин, миансерин, миртазапин, тримипрамин), барбитуратами, бензодиазепинами, клонидином, производными морфина (анальгетики, противокашлевые препараты), нейролептиками, анксиолитиками, антагонистами Н1-гистаминовых рецепторов, гипотензивными препаратами центрального действия, талидомидом, баклофеном, пизотифеном усиливается угнетающее действие на ЦНС. При одновременном применении с атропином и атропиноподобными средствами, имипрамином, противопаркинсоническими средствами с антихолинергическим действием, дизопирамидом, производными фенотиазина повышается риск развития антихолинергических побочных эффектов (сухость во рту, запор, задержка мочеиспускания). При одновременном применении с этанолом усиливается седативное действие доксиламина, необходимо избегать его одновременного употребления с алкогольными напитками и лекарственными препаратами, содержащими этанол.

Особые указания

Как все снотворные или седативные средства, доксиламин может усугублять синдром ночного апноэ, увеличивая число и продолжительность приступов апноэ. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период применения доксиламина, в связи с возможной сонливостью в дневное время суток, следует избегать вождения транспортных средств, а также других видов деятельности, требующих быстрых психомоторных реакций

Условия хранения

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.