Инструкция по применению
Смесь для ингаляций Раствор 40 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эвкалипта прутовидного листьев настойка+[Левоментол/Рацементол]
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Описание

Смесь для ингаляции в растворе - комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает отхаркивающее и антисептическое действие.

Действующее вещество

Эвкалипта прутовидного листьев настойка+[Левоментол/Рацементол]

Состав

Действующие вещества: 1 мл раствора содержит: ментола 0,0071 г, настойки листьев эвкалипта (Eucalypti folium) (1:5) (экстрагент – этанол 70 %) 0,357 мл, глицерина (85 %) 0,357 г, вспомогательное вещество: этанол 96 %.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Местное лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний различной этиологии.

Способ применения и дозы

2,5 мл (0,5 чайной ложки) препарата растворить в стакане теплой воды и использовать в виде ингаляций. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта, характера комплексной терапии и переносимости препарата.

Противопоказания

Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к любым компонентам препарата, бронхиальная астма, бронхоспазм. Возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно только после оценки врачом соотношения риск/польза.

Побочные действия

Аллергические реакции, в том числе высыпания на коже, зуд, покраснение, контактный дерматит (в области губ), отек Квинке, крапивница, бронхоспазм, ларингоспазм, апноэ. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу!

Передозировка

При длительном применении в больших дозах возможны головокружение, спутанность сознания, мышечная слабость, тошнота, двоение в глазах, раздражение в области губ и носа.В таких случаях прекращают прием препарата. Терапия симптоматическая.

Взаимодействие с другими препаратами

В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особые указания

Препарат может влиять на скорость реакции, поэтому при его применении следует удерживаться от управления автотранспортом или осуществление потенциально опасных видов деятельности.