Инструкция по применению
Снуппик Капли назальные 0,01 % 5 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Оксиметазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.01%

Описание

Прозрачный бесцветный раствор.

Действующее вещество

Оксиметазолин

Состав

Состав на 1 мл Действующее вещество: оксиметазолина гидрохлорид - 0,10 мг. Вспомогательные вещества: морская вода, лимонной кислоты моногидрат, натрия цитрата дигидрат, глицерол 85 %, вода для инъекций.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном интраназальном применении оксиметазолин не обладает системным действием. Период полувыведения оксиметазолина при его интраназальном введении составляет 35 ч. 2,1 % оксиметазолина выводится почками и около 1,1 % через кишечник.

Показания

- Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), - острый аллергический ринит, - вазомоторный ринит, - для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа (синуситах), евстахиите, среднем отите, - для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в полости носа.

Способ применения и дозы

Препарат Оксиметазолин капли назальные 0,01 % предназначен для применения у детей в возрасте до 1 года. Интраназально. Детям в возрасте до 4 недель - по 1 капле в каждую ноздрю 2-3 раза в день. Детям с 5-ой недели жизни и до 1 года - по 1-2 капли в каждую ноздрю 2-3 раза в день. 1 капля препарата Оксиметазолин содержит 2,8 мкг оксиметазолина гидрохлорида. Перед применением очистить полость носа. Снять с флакона защитный колпачок, флакон перевернуть таким образом, чтобы носик насадки был направлен вниз, ввести насадку в полость носа, для введения 1 капли нажать на ободок насадки 1 раз. Препарат следует закапывать, запрокинув голову ребенку. Доказана эффективность также и следующей процедуры: в зависимости от возраста 1-2 капли препарата наносят на вату и протирают каждую ноздрю. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3-х дней, необходимо проконсультироваться с врачом. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять не более 7-ми дней. Дозы, выше рекомендованных, можно применять только под наблюдением врача. При частом и длительном использовании препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или усилиться. При появлении этих симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

Противопоказания

- Атрофический (сухой) ринит, - закрытоугольная глаукома, - состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии, после хирургических вмешательств на твердой мозговой оболочке (в анамнезе), - гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

При применении препарата в период беременности, при предположении о возможной беременности или планировании беременности, а также в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом. При применении оксиметазолина в период беременности или грудного вскармливания не следует превышать рекомендуемую дозу. Препарат может применяться только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Частота побочных реакций определялась в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения: очень часто (> 10%), часто (> 1% и 0,1% и 0,01% и < 0,1%), очень редко (< 0,01%), частота неизвестна (не может быть подсчитана на основании имеющихся данных). Нарушения со стороны иммунной системы: Нечасто: отек Квинке, зуд. Нарушения со стороны нервной системы: Редко: головная боль, бессонница. Очень редко: усталость, сонливость, беспокойство, галлюцинации. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: Нечасто: тахикардия, повышение артериального давления. Редко: ощущения сердцебиения. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: Часто: жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чихание. Нечасто: чувство «заложенности» носа (реактивная гиперемия), носовое кровотечение. Очень редко: остановка дыхания (у младенцев). Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: Очень редко: судороги. Побочные эффекты, обусловленные системным действием препарата: головокружение, чувство тревоги, раздражительность, нарушение сна (у детей), тошнота, экзантема, нарушение зрения (при попадании в глаза). Длительное или непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отеку слизистой оболочки полости носа (медикаментозный ринит). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Клинические признаки интоксикации производными имидазола могут быть неспецифическими и нечеткими, поскольку фазы гиперактивности сменяются фазами угнетения центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Симптомы: тревога, беспокойство, галлюцинации, судороги, понижение температуры тела, вялость, сонливость, кома, сужение или расширение зрачков, лихорадка, потливость, бледность, цианоз, ощущение сердцебиения, брадикардия, аритмия, остановка сердца, повышение артериального давления, снижение артериального давления, тошнота, рвота, угнетение дыхания, остановка дыхания. У детей передозировка может быть причиной развития таких симптомов со стороны центральной нервной системы, как возбуждение, судороги, кома, брадикардия, остановка дыхания, а также повышение артериального давления с последующим возможным снижением артериального давления. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля (при случайном попадании препарата внутрь), симптоматическое. При тяжелой передозировке показана интенсивная терапия в условиях стационара. Применение сосудосуживающих средств противопоказано.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении оксиметазолина с ингибиторами моноаминооксидазы (в течение предшествующих 2 недель и в течение 2 недель после их отмены), трициклическими антидепрессантами или другими препаратами, способствующими повышению артериального давления, может наблюдаться повышение артериального давления. Препарат замедляет всасывание местноанестезирующих препаратов, удлиняет их действие. Совместное применение других сосудосуживающих препаратов повышает риск развития побочных эффектов.

Особые указания

Избегать попадания препарата в глаза. Во избежание распространения инфекции необходимо использовать препарат индивидуально. Морская вода, входящая в состав препарата, способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа за счет способности улучшать функцию мерцательного эпителия и нормализации выработки слизи в бокаловидных клетках слизистой оболочки. Морская вода увлажняет слизистую оболочку полости носа, препятствуя возникновению сухости, связанной с применением оксиметазолина. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: После длительного применения средств от насморка, содержащих оксиметазолин, в дозах, превышающих рекомендуемые, нельзя исключать общее влияние на сердечно-сосудистую систему и центральную нервную систему. В этих случаях рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

12 месяцев

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. После вскрытия флакона препарат должен быть использован в течение 12 месяцев.