Инструкция по применению
Софья крем для тела с пчелиным ядом 125 мл

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: КоролевФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Пчелиный яд - высокоэффективное натуральное средство для профилактики и лечения широкого круга заболеваний суставов и позвоночника. Пчелиный яд обладает выраженным противовоспалительным, разогревающим, обезболивающим, бактерицидным, иммунокорректирующим действием, активизирует кровоток, улучшает обмен веществ в суставе и питание в суставных тканей. Повышая проницаемость кожных покровов, пчелиный яд способствует глубокому проникновению лечебных компонентов в проблемную область.Экстракты и масла лекарственных растений - обеспечивают суставы питательными веществами, улучшают метаболизм в суставных тканях, стимулируют восстановительные процессы в хряще, повышают качество внутрисуставной жидкости, оказывают противовоспалительное, противоотечное и антиоксидантное действие, предупреждают развитие болевого синдрома.Гидролизат каллогена - является сторительным материалом для опорно-двигательного аппарата, способствует регенерации и укреплению соединительной ткани позвоночника, суставов и связок, повышает амортизационные свойства (упрегость) хряща и синовиальной жидкости. Липосомальный-эмульсионный комплекс - способствует быстрому и глубокому проникновению действующих веществ, без снижения их эффективности, через кожные покровы в глубь тканей.

Состав

Вода, сорбитол, пчелиный воск, масла: кукурузное, растительное, кедровое, водноспиртовые экстракты: земляники, прополиса, девясила, розмарина, хрена, шалфея, масляные экстракты: березы, бузины, зверобоя, крапивы, полыни, лопуха, рябины, ромашки, эмульсионный воск, пчелиный яд, эпидермат-О, ланолин, витанол, стеарат ДЭГ, отдушка, консерванты.

Форма выпуска

Крем

Показания

Улучшение функционального состояния опорно-двигательного аппарата, увеличение подвижности суставов.

Способ применения и дозы

Крем наносится круговыми движениями в течение 3-5 минут до полного впитывания 2-3 раза в день.По возможности обеспечить покой и тепло.Продолжительность применения 3-5 недель.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Не следует наносить на открытые раны, на слизистые оболочки, при наличии гнойных процессов, глубоком венозном тромбозе.

Побочные действия

Редко: аллергические реакции.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте.