Инструкция по применению
Солидаго композитум С Раствор для внутримышечного введения Ампулы 2,2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5
Срок годности: 60

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии острого и хронического цистита.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Solidago virgaurea (Солидаго виргауреа) D3 22 мкл, Berberis vulgaris (Берберис вульгарис) D4 22 мкл, Vesica urinaria suis (Везика уринария суис) D8 22 мкл, Pyelon suis (Пиелон суис) D10 22 мкл, Ureter suis (Уретер суис) D10 22 мкл, Urethra suis (Уретра суис) D10 22 мкл, Terebinthina laricina (Теребинтина ларицина) D6 22 мкл, Mercurius sublimatus corrosivus (Меркуриус сублиматус коррозивус) D8 22 мкл, Arsenicum album (Арсеникум альбум) D28 22 мкл. Cuprum sulfuricum (Купрум сульфурикум) D6 22 мкл, Bucco (Букко) D8 22 мкл, Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) D10 22 мкл, Capsicum annuum (Капсикум аннуум) D6 22 мкл, Orthosiphon aristatus (Ортосифон аристатус) D6 22 мкл, Equisetum hyemale (Эквизетум гиемале) D4 22 мкл, Chondodendron tomentosum (Хондодендрон томентозум) D6 22 мкл, Cantharis (Кантарис) D6 22 мкл, Apisinum (Апизинум) D8 22 мкл, Baptisia tinctoria (Баптизия тинктория) D4 22 мкл, Natrium pyruvicum (Натриум пирувикум) D10 22 мкл, Pyrogenium-Nosode (Пирогениум-Нозоде) D198 22 мкл, Sarsaparilla (Сарсапарилла) D6 22 мкл, Colibacillinum Nosode (Колибациллинум Нозоде) D13 22 мкл, Coxsackie-Virus A9-Nosode (Коксакие-Вирус А9-Нозоде) D8 22 мкл, Argentum nitricum (Аргентум нитрикум) D6 22 мкл, Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1650 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

В комплексной терапии острого и хронического цистита.

Способ применения и дозы

Внутримышечно, по 1 ампуле 1 -3 раза в неделю. Кратность и продолжительность применения препарата устанавливается лечащим врачом. Курс лечения - 3 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Известная повышенная чувствительность к Solidago или другим растениям семейства сложноцветных. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение. В этих случаях препарат следует отменить.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться врачу. Употребление кофе сорта арабика (Coffea arabica) до приема и после приема препарата, может уменьшать терапевтическую эффективность Lytta vesicatoria (Cantharis).

Условия хранения

В сухом месте