Инструкция по применению
Солкосерил гель 10% 20г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Швейцария
Производитель: Legacy Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Депротеинизированный гемодериват крови телят
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10%
Срок годности: 60



Действующее вещество

Депротеинизированный гемодериват крови телят

Состав

В 1 г геля содержится: Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят (в пересчете на сухое вещество) 4.15 мгВспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, кармеллоза натрия, пропиленгликоль, кальция лактат пентагидрат, вода д/и.

Форма выпуска

Гель

Показания

Солкосерил гель/мазь применяются в следующих случаях:- незначительные повреждения (ссадины, царапины, порезы);- ожоги 1 и 2 степени (солнечные ожоги, термические ожоги);- отморожения - трудно заживающие раны (в т.ч. трофические язвы и пролежни).Для лечения трофических поражений тканей различного происхождения Солкосерил применяется только после удаления из раны некротизированных тканей.Солкосерил гель применяется в начальной стадии лечения и наносится на свежие раны, раны с влажным отделяемым или язвы с явлениями мокнутия.

Способ применения и дозы

Солкосерил применяют местно, наносят непосредственно на раневую поверхность после предварительного очищения раны с применением дезинфицирующего раствора. Перед началом лечения трофических язв, а также в случаях гнойного инфицирования раны необходима предварительная хирургическая обработка.Солкосерил гель наносится на свежие раны, раны с влажным отделяемым, на язвы с явлениями мокнутия тонким слоем на очищенную рану 2-3 раза/сут. Участки с начавшейся эпителизацией рекомендуется смазывать Солкосерилом мазью. Применение Солкосерила геля продолжают до образования выраженной грануляционной ткани на поврежденной поверхности кожи и подсыхания раны.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.С осторожностью следует применять при предрасположенности к аллергическим реакциям.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Солкосерила, как и всех других лекарственных препаратов, нежелательно в период беременности и лактации и возможно только при крайней необходимости и под контролем врача.

Побочные действия

В редких случаях в месте нанесения Солкосерила могут развиваться аллергические реакции в виде крапивницы, краевого дерматита. В этом случае необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.В месте нанесения Солкосерила геля может отмечаться кратковременное жжение. Если жжение долго не проходит, от применения Солкосерила геля следует отказаться.

Передозировка

Сведения об эффектах передозировки Солкосерила (раствор для инъекций, гель, мазь) отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие Солкосерила с другими лекарственными препаратами местного действия не установлено.

Особые указания

В случае появления болевых ощущений, покраснения участков кожи рядом с местом нанесения Солкосерила, выделения секреции из раны, повышения температуры необходимо срочно обратиться к врачу.В случае, если при применении Солкосерила не наблюдается заживления пораженного участка в течение 2-3 недель, необходимо обратиться к врачу.

Условия хранения

Беречь от детей